



Mi Universidad

Nombre del Alumno: Ventura Morales Danna Paola

Nombre del tema: cuadro sinóptico

Nombre de la Materia: practicas profesionales

Nombre del profesor: María del Carmen López

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en enfermería y nutrición

Cuatrimestre 9 grupo A

Comitán de Domínguez Chiapas. julio del 2022

OBSTRUCCION DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

APOYO VITAL BÁSICO

El principal objetivo de un Soporte Vital Básico es el de reestablecer las funciones vitales básicas consiguiendo la oxigenación de los tejidos.

El Soporte Vital Básico es un conjunto de maniobras que permiten identificar si una persona está sufriendo una parada cardiorrespiratoria y aplicar en ella una sustitución temporal de las funciones respiratorias mediante dichas maniobras hasta que la víctima pueda recibir atención médica.

ALGORITMO DE PARO CARDÍACO PEDIÁTRICO

1
Activa el sistema de emergencias

Inicia rcp

- Inicia ventilación con bolsa mascarilla y suministre oxígeno
- Conecte el desfibrilador

¿El ritmo es desfibrilable?

SI
2
FV/TV Sin pulso
3
Descarga

4
• 2min de rcp obtenga acceso IV/IO

¿El ritmo es desfibrilable?

SI
5
• Administre adrenalina cada 3 a 5 min
• Considere la posibilidad de usar un dispositivo avanzado de la vía aérea y capnografía

¿El ritmo es desfibrilable?

SI
6
• Administre adrenalina cada 3 a 5 min
• Considere la posibilidad de usar un dispositivo avanzado de la vía aérea y capnografía

NO
7
• 2min de rcp
• Administre amiodarona o lidocaína
• Trate las causas reversibles

NO
8
• Si no existen signos de retorno de la circulación espontánea vaya al punto 10 u 11
• Si existe RCE ir a cuidados posparo cardiaco
• Considere si es apropiado continuar con la reanimación 5

NO
• Si no existen signos de retorno de la circulación espontánea vaya al punto 10 u 11
• Si existe RCE ir a cuidados posparo cardiaco
• Considere si es apropiado continuar con la reanimación

SI
Vaya al punto 5 y 7

NO
9
Asistolia/AESP
Adrenalina lo antes posible

10
• 2min de rcp obtenga acceso IV
• Administre adrenalina cada 3 a 5 min
• Considere la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado de la vía aérea y capnografía

¿El ritmo es desfibrilable?

NO
11
• 2min de rcp
• Trate las causas reversibles

¿El ritmo es desfibrilable?

SI
Vaya al punto 5 y 7

NO
12
• Si no existen signos de retorno de la circulación espontánea vaya al punto 10 u 11
• Si existe RCE ir a cuidados posparo cardiaco
• Considere si es apropiado continuar con la reanimación

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una respuesta organizada y secuencial al paro cardíaco, la iniciación inmediata de las maniobras de compresión torácica ininterrumpidas y la desfibrilación temprana (cuando está indicada) son fundamentales para el éxito. Consiste en una serie de procedimientos que podemos aplicar a personas víctimas de un paro cardiorrespiratorio.

Bibliografía

- <https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/biblioteca/400ab87ab865853f0df00462c04299ec.pdf>
- <file:///C:/Users/52963/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Network%20Shortcuts/4d88190333afef242397f3575a812f59.pdf>