

NOMBRE DE ALUMNO: JESÚS ANDRÉS LECONA GARCÍA.

NOMBRE DEL PROFESOR: LIC. SANDY NAXCHIELY MOLINA

NOMBRE DEL TRABAJO: SÚPER NOTA TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN.

MATERIA: PSICOPATOLOGÍA.

GRADO: 6° CUATRIMESTRE.

GRUPO: -



Criterios de diagnostico.

B. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos cuatro semanas en niños y adolescentes y típicamente seis o más meses en adultos.

C. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento.

D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como rechazo a irse de casa por resistencia excesiva al cambio en un trastorno del espectro autista, delirios o alucinaciones

2
Existe miedo o ansiedad persistente sobre los posibles daños que puedan sufrir las personas por las que siente apego

3
ansiedad excesiva ante el alejamiento del hogar o de las personas a quienes el sujeto está vinculado.

Los sujetos con este trastorno presentan los siguientes criterios.

* Malestar excesivo recurrente.

* Bienestar o muerte de la persona del apego

4
Los sujetos con ansiedad por separación se muestran reacios o rechazan irse solos debido a su temor ante la separación.

Trastorno de ansiedad por separación.

1
La persona con trastornos de ansiedad por separación se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que siente apego en un grado que es inapropiado para el desarrollo.

6 TAS TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN



A. Miedo o ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por las que siente apego, puesta de manifiesto por al menos tres de las siguientes circunstancias:

- Malestar excesivo recurrente.
- Preocupación excesiva persistente.
- Posibilidad de un acontecimiento adverso.
- Resistencia o rechazo a salir.

- Miedo excesivo.
- Rechazo a dormir fuera de casa.
- Pesadillas repetidas.
- Quejas repetidas de síntomas físicos.



5
Los niños con trastorno de ansiedad por separación son a veces incapaces de permanecer en una habitación solos y pueden manifestar comportamientos de "aferramiento",

