



Universidad del sureste



Prácticas profesionales

Docente: Lic. Sandra Edith Fonseca Morales

“TIPOS DE SHOCK”

Alumna: Dulce Citlali Encino Camaras.

Cuatrimestre: 9°

Lic. En enfermería



San Cristóbal de las casas, Chiapas

20 de mayo de 2022



shock

Estado de hipoperfusión de los órganos que produce disfunción y muerte celular.

Clasificación

Shock Hipovolémico

Caracterizado por disminución efectiva de volumen circulante intravascular.

Signos y síntomas

Caída de la tensión arterial.
Hipotermia.
Sudoración fría.
Ansiedad.

Estado de confusión.
Debilidad general.
Palidez de la piel.
Pulso rápido, aunque muy débil.

Shock Cardiogénico:

Se relaciona directamente con la falla de la bomba cardiaca con alteración de la contractibilidad miocárdica funcional o estructural.

Signos y síntomas

taquicardia
oliguria
vasoconstricción
alteración del estado de conciencia
taquipnea
disnea

hipotensión
disforesis
hepatomegalia
distensión yugular
edema
cambios metabólicos

Shock Obstructivo

se debe a factores mecánicos que interfieren con el llenado o vaciado del corazón o los grandes vasos.

Signos y síntomas

alteración del estado mental, taquipnea,, taquicardia,
alteración de la perfusión: tiempo de relleno capilar prolongado,

piel marmórea, con presencia de reticulados.
pulsos periféricos débiles,
hipotensión,
oligoanuria

Shock Distributivo

se produce por una inadecuación relativa del volumen intravascular debida a vasodilatación venosa o arterial

Causado por:

Shock Séptico

infección bacteriana con liberación de endotoxinas

Signos y síntomas

Respiración rápida.
Palpitaciones por aumento de la frecuencia cardiaca.
Confusión y mareos por alteración del nivel de conciencia.
Disminución de la diuresis.
Fiebre

Cambios en la temperatura y coloración de la piel.
Debilidad generalizada y malestar por disminución de la presión arterial.

shock anafiláctico

severa reacción anafiláctica (rápidamente progresiva,..)

Signos y síntomas

hipotensión, taquicardia, urticaria, angioedema, sibilancias, estridor, cianosis y síncope,

sensación de asfixia o disnea, palpitaciones y mareos

Shock Neurogénico

repentina pérdida del tono autonómico debido a lesión en la medula espinal

Signos y síntomas

la piel esta roja y caliente al inicio paraluego ser seguida de hipotermia por disminución de la resistencia vascular sistémica.

hipotensión y bradicardia, posteriormente se presenta taquicardia e hipertensión.