



Mi Universidad

Tesis terminada

NOMBRE DEL ALUMNO: Karen Jazmín campos cruz

TEMA: “Prevención de complicaciones de la diabetes mellitus tipo II en pacientes de 50-60 años”

PARCIAL: I

MATERIA: Seminario de tesis

NOMBRE DEL PROFESOR: Ervin silvestre castillo

LICENCIATURA: En enfermería

CUATRIMESTRE: 9no

AGRADECIMIENTOS

A Dios:

Por su amor y bondad, por permitirme tener vida, salud, por no dejarme en los momentos difíciles, por darme fuerzas e impulsarme y guiarme para poder realizar uno más de mis propósitos y concluir la carrera.

A mi Madre:

Que con su demostración de una madre ejemplar me ha enseñado a no desfallecer ni rendirme ante nada y siempre perseverar a través de sus consejos. Por ser el pilar fundamental y apoyo en mi formación académica y en mi vida. Gracias por inculcarme valores, principios y perseverancia, por eso te doy mi trabajo en ofrenda por tu paciencia y amor incondicional madre mía, te amo.

A mis hermanas:

De sangre y de corazón Alejandra y Leydi no solo por estar presentes aportando buenas cosas a mi vida, sino por los grandes lotes de felicidad y diversas emociones que causan en mí, además que son mi ejemplo a seguir y motivación para alcanzar esta meta.

A la universidad UDS:

Por aceptarme como parte de ella para prepararme como profesionalista, así también a los docentes que me brindaron enseñanzas, conocimientos y me otorgaron el apoyo en cada proceso, además de las bonitas experiencias vividas.

A mi asesor de tesis:

MASS. Ervin Silvestre Castillo por haberme brindado la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento científico durante el proceso de la carrera y el desarrollo de tesis, además de ser para mí un excelente catedrático con entrega, dedicación, paciencia y mucha empatía. Gracias por cada una de sus enseñanzas.

Conny Yanini López Méndez

A MIS PADRES:

QUE ME HAN CONDUCTIDO POR LA VIDA CON AMOR Y
PACIENCIA,HOY VEN FORJADO UN ANHELO Y DESEO. COMO UN
TESTIMONIO DE ETERNO AGRADECIMIENTO POR TODO EL
APOYO QUE SIEMPRE ME HAN BRINDADO Y CON EL CUAL HE
LOGRADO TERMINAR MI CARRERA PROFESIONAL QUE ES
PARA MÍ, LA MEJOR DE LAS HERENCIAS.

KAREN JAZMÍN CAMPOS CRUZ

- ❖ **A mis Padres, que me apoyaron en esta etapa de mi vida.**

- ❖ **A toda mi familia por darme ánimo durante este proceso.**

- ❖ **A los tutores por dedicarnos su tiempo para el proceso de enseñanza y transmitirme sus conocimientos.**

- ❖ **Por último, pero no menos importante a todos mis familiares y amigos**

Nelfo Jonatan Diaz Roblero.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	5
1.1.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA	5
1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	8
1.3.- OBJETIVOS.....	9
1.4.- HIPÓTESIS.....	10
1.5.- JUSTIFICACIÓN.....	11
1.6.- DELIMITACION DEL ESTUDIO.....	13
CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA	16
2.1 MARCO HISTÓRICO.....	16
2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	20
2.3. MARCO TEÓRICO.....	26
2.3.1. ANATOMÍA Y FISIOLÓGÍA DEL PÁNCREAS	26
2.3.2. DIABETES MELLITUS.....	30
2.3.3. CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES	31
2.3.4. CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II.....	33
2.3.5. CUADRO CLINICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II	36
2.3.6. DIAGNÓSTICO.....	37
2.3.7. TRATAMIENTO	39
2.3.8. COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II....	43
2.3.9. PREVENCION	50
2.4. MARCO CONCEPTUAL	54
CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO	59
3.1 FORMAS O TIPOS DE INVESTIGACIÓN	60
3.2 TIPOS DE ESTUDIO.....	61
3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN	63
3.4 ENFOQUES	65
3.5 UNIVERSO O POBLACIÓN.....	68
3.6 MUESTRA.....	70
3.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.....	73

3.8 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS	74
CAPITULO VI: RESULTADOS.....	80
4.1 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL MARCO METODOLOGICO	80
4.2 PROCESAMIENTO DE LA INOFRMACIÓN	81
SUGERENCIAS Y/O PROPUESTAS.....	104
CONCLUSIONES.....	106
BIBLIOGRAFIAS	108
ANEXOS	111

INTRODUCCIÓN

(Canonge, 2010) Afirma:

La Diabetes Mellitus es un trastorno metabólico crónico que se caracteriza por unos niveles séricos elevados de glucosa, y es considerada uno de los factores de riesgo más importantes para la enfermedad cardiovascular.

La diabetes mellitus es una enfermedad que puede causar complicaciones tardías o crónicas, pueden aparecer en la diabetes mellitus antes de su diagnóstico, o durante la etapa de intolerancia a la glucosa. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por un conjunto heterogéneo de síndromes hiperglucemiantes como resultado de un defecto en la función de las célula Beta y/o disminución de la sensibilidad a la insulina en los tejidos diana. En el mundo afecta a más de 220 millones de personas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que los nuevos casos de diabetes se doblarán en los próximos 25 años de 135 millones a cerca de 300 millones. Mucho de este crecimiento tendrá lugar en países en desarrollo donde la edad, dietas poco saludables, obesidad y estilos de vida sedentarios contribuirán a la aparición de la enfermedad.

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad crónica de etiología diversa que cursan con hiperglicemia como resultado de un defecto absoluto (Diabetes Mellitus Tipo 1) o relativo (Diabetes Mellitus Tipo 2) de la secreción de insulina por las células beta del páncreas, existiendo también otros tipos de diabetes como la diabetes gestacional. La diabetes Mellitus Tipo 2: (No insulino dependiente o de inicio en la edad adulta) cursa con un defecto progresivo en la secreción de insulina, asociado a insulina resistencia. Corresponde al 90% de la diabetes en la población adulta, es

una enfermedad metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre.

La diabetes afecta a todos los órganos y sistemas alterando funciones, de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad, control, factores predisponentes como la Hipertensión Arterial, Sobrepeso, y Glicemia Capilar. La diabetes aumenta el riesgo de cardiopatía y accidente vascular cerebral, 50% de los pacientes diabéticos mueren por esta causa. Cerca del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios, en personas menores de 70 años, y el 55% en mujeres. La diabetes puede afectar profundamente a la calidad de vida de las personas en términos de bienestar psicológico y social, de la misma forma que en términos físicos.

Las enfermedades no transmisibles (ENT) son consideradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la principal causa de mortalidad y discapacidad mundial. Constituyen uno de los mayores retos que enfrentan los sistemas de salud debido a varios factores: gran número de casos afectados, creciente contribución a la mortalidad general, conformación en la causa más frecuente de incapacidad prematura y la complejidad y costo elevado de su tratamiento.

Su emergencia, como problema de salud pública, fue resultado de cambios sociales y económicos que modificaron el estilo de vida de un gran porcentaje de la población. La epidemia mundial de ENT causó en el 2014 en 47 países (principalmente de altos ingresos), más del 90% de los años de vida perdidos, y en más de 100 países las muertes por enfermedades no transmisibles y lesiones están ahora aumentando a un ritmo muy rápido.

Las enfermedades no transmisibles ocasionan más de 75 % de las muertes en México. No solo constituyen las principales causas de mortalidad, sino también provocan más años de vida potencial perdidos (AVPP). A su vez, se asocian a una significativa carga de enfermedad y necesidad de utilización de recursos sanitarios. Se estima que en los próximos años la mortalidad continuará aumentando en nuestro país, y que a ello contribuirá en buena medida el aumento de la esperanza de vida, que ya ha alcanzado los 76.50 años en hombres y los 80.45 en mujeres.

(Julie, 2014) Menciona:

La diabetes mellitus (DM), por sí misma, no debe considerarse como una enfermedad intrínsecamente incapacitante; generalmente es compatible con una actividad laboral normal que sólo requiere mantener un régimen higiénico-dietético o un tratamiento adecuado. En algunos casos puede tener un curso más agresivo y sintomático y desarrollar complicaciones que condicionen una incapacidad temporal, y en otras ocasiones las lesiones que va produciendo la enfermedad, las complicaciones sobrevenidas y los tratamientos empleados podrán originar una incapacidad permanente con el paso del tiempo.

De las 10 enfermedades más frecuentes causantes del 67 % o más de la pérdida de capacidad general para el trabajo, solo la diabetes escaló dos posiciones, pues las otras se mantuvieron en el puesto, descendieron o aumentaron un peldaño. La DM provoca invalidez cuando se convierte en causa de insuficiencia renal crónica, amputación de miembros, enfermedad coronaria, evento cerebrovascular y ceguera.

La magnitud alcanzada por la DM, unido a sus consecuencias, hace que esta se mantenga como problema de salud en México y en otros países.

Todo esto infiere que a pesar de lo mucho que se ha avanzado en el estudio de la morbilidad y mortalidad, en cuanto a prevalencia de invalidez secundaria a complicaciones de la diabetes mellitus, aún existe un desconocimiento de la temática en el país mexicano, donde no se cuenta con amplias estadísticas publicadas necesarias para la toma de decisiones en los estratos más pequeños de la población; de esta manera se contribuye no solo a mejorar la calidad de vida de los pacientes diabéticos, sino también para disminuir los costos en lo que a salud se refiere, es por ello que se realiza esta investigación con el objetivo de prevenir las complicaciones en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Estudios llevados a cabo en nuestro País señalan que las personas con diabetes experimentan una pobre calidad de vida con respecto a individuos saludables, donde el área más afectada ha sido el rol de funcionamiento físico.

En México existen algunas experiencias sobre estudios de calidad de vida, específicamente con diabetes mellitus solo existen dos estudios que señalan que los pacientes presentaron moderada afectación de su calidad de vida.

Dada la frecuencia de esta enfermedad y las probabilidades de complicaciones consideramos necesario la realización de un estudio que nos permita identificar el estado de salud de los pacientes diabéticos tales como las complicaciones que afectan a los pacientes crónicos del Barrio Santa Cruz en Frontera Comalapa.

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

“PREVENCION DE COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II EN PACIENTES DE 50 A 60 AÑOS”.

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Actualmente, la diabetes mellitus (DM) es considerada una de las mayores epidemias del siglo XXI, siendo la principal causa de muerte en la mayoría de los países, con estimaciones de afectar a 415 millones de adultos en todo el mundo y de poder alcanzar a 318 millones que tienen intolerancia a la glucosa - lo que aumenta el riesgo en desarrollar la enfermedad en un futuro -, con proyecciones de 624 millones para 2040, en que una de cada diez personas tendrá DM.

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cantidad de personas que sufren de diabetes en todo el mundo ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2016, del mismo modo ha habido un aumento en el mundo de la diabetes en personas con una edad mayor de 18 años del 4.7% en el año 1980 al 8.5% en el año 2016. Esto también muestra que la prevalencia de diabetes en los países de medianos y menos recursos está aumentando más rápidamente. Por este motivo son causas principales de ceguera, daño renal, infartos, accidentes cerebrovasculares y amputación de las extremidades inferiores.

Según las cifras la diabetes fue la causa principal de 1.6 millones de muertes en 2015, otros 2.2 millones de personas fallecieron de hiperglucemia. Según la predicción de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes se convertirá en la séptima causa de muerte en 2030. A nivel mundial, según el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la diabetes, la tasa de mortalidad debido a la hiperglucemia varía

mucho entre las distintas regiones de la OMS. El Mediterráneo oriental, el sudeste asiático y África tienen las tasas de incidencia más altas, en otras regiones esta relación es mucho menor, en Europa, el sudeste asiático y las Américas, la tasa de mortalidad causada por un nivel alto de azúcar en sangre es bastante más elevada en los hombres que en mujeres.

La diabetes es una enfermedad crónica que crece a un ritmo alarmante en América Latina y el Caribe. Belice tiene la prevalencia más alta con 12.4% y México 10.7%. No obstante, no mucho más bajo es que Managua, Ciudad de Guatemala y Bogotá todavía están entre el 8% y el 10%, mientras que en Estados Unidos la proporción es de alrededor del 9.3%.

La creciente incidencia y prevalencia de la DM puede atribuirse al aumento de la expectativa de vida, proceso avanzado de industrialización y urbanización y cambios en el estilo de vida que proporcionan el aumento del número de personas sedentarias y con sobrepeso/obesidad. En ese escenario, la referida enfermedad crónica es considerada uno de los principales problemas de salud pública debido a la alta morbimortalidad proveniente de sus complicaciones crónicas, ocasionando gastos elevados de los servicios de salud para control y tratamiento de estos problemas, además de la reducción del personal trabajador y del impacto biosicosocial en las personas afectadas.

Asociado a los factores epidemiológicos y fisiopatológicos de la DM, esa condición crónica tiene tratamiento complejo, lo que demanda adhesión de la persona afectada responsable de más de 95% del tratamiento por medio de comportamientos de autocuidado que engloben alimentación saludable, práctica de actividad física, medición de la glicemia y el uso correcto de la medicación.

La carga de la Diabetes por pérdida de la calidad de vida y una sobrevivencia menor se concentra en aquellos países con presupuestos bajos para el cuidado de la salud. En 1990, dentro de los diez primeros diagnósticos de muertes en México no aparecía la diabetes mellitus. Años más tarde, el infarto agudo almiocardio y las enfermedades cerebrovasculares ocupan el primer y segundo lugar, y en forma dramática aparece la diabetes mellitus ocupando la tercera causa. El control de la diabetes mellitus es necesario ya que sus complicaciones representan un alto costo para el sistema de salud, una mala calidad de vida para el paciente y un impacto económico y psicológico negativo para su familia y la sociedad.

A nivel local, la investigación se llevará a cabo en el Barrio Santa Cruz, Municipio de Frontera Comalapa, donde se ha visualizado que los pacientes con diabetes tipo 2, en ocasiones se encuentran deprimidos, un poco irritables y viceversa, lo que indica que no han encontrado sentido acorde con la continuación del tratamiento, pero también existen pacientes que planean cumplir con el tratamiento pero no saben qué medidas exactas se deben tomar para evitar complicaciones de la enfermedad, no obstante también se ha tenido conversación con los pacientes que comentan que las enfermeras apenas brindan información sobre los cuidados que deben recibir, solo siguen los procedimientos y son poco expresivas, en tal sentido el presente estudio trata de encontrar la relación entre el cuidado que brinda el profesional de enfermería en relación del nivel de la prevención de complicaciones del paciente con diabetes tipo 2, a través de las siguiente interrogante:

¿Conocen las medidas de prevención para evitar las complicaciones más comunes los pacientes diabéticos de 50 a 60 años?

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los pacientes diabéticos de 50 a 60 años del Barrio Santa Cruz sobre las complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo II?

2.- ¿Cuáles son las complicaciones crónicas más frecuentes de la Diabetes Mellitus tipo II?

3.- ¿Qué impacto tienen estas complicaciones en la percepción de la calidad de vida de las personas que la padecen?

4.- ¿Conocen las medidas preventivas de las complicaciones de la Diabetes tipo II, los pacientes diabéticos de 50 a 60 años del Barrio Santa Cruz?

5.- ¿Identifican los signos y síntomas de la hiperglucemia los pacientes diabéticos de 50 a 60 años del Barrio Santa Cruz?

6.- ¿Saben las medidas para el control de la glucosa los pacientes diabéticos de 50 a 60 años del Barrio Santa Cruz?

7.- ¿Reconocen los pacientes diabéticos de 50 a 60 años del Barrio Santa Cruz el tratamiento farmacológico para la Diabetes Mellitus tipo II?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. GENERAL

Determinar y prevenir las complicaciones crónicas más frecuentes de la diabetes mellitus tipo II y de esta manera mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

1.3.2. ESPECIFICOS

- Determinar el nivel de conocimiento de los pacientes diabéticos sobre las complicaciones más frecuentes de la Diabetes Mellitus tipo II.
- Identificar las complicaciones crónicas más frecuentes que afectan a los pacientes con diabetes mellitus tipo II.
- Explicar el impacto que tienen las complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo II en la calidad de vida de los pacientes.
- Enlistar las medidas preventivas de las complicaciones más frecuentes de la Diabetes Mellitus tipo II.
- Identificar la relación que existe entre el cuidado de enfermería en su dimensión técnica y la prevención de complicaciones en pacientes diabéticos tipo II.
- Dar a conocer los signos y síntomas más comunes de la hiperglucemia.
- Enumerar las medidas para el buen control de la glucosa.
- Citar el tratamiento farmacológico y no farmacológico para el buen control de la glucosa en sangre.

1.4.- HIPÓTESIS

La falta de conocimiento por parte de los pacientes diabéticos de 50 a 60 años del Barrio Santa Cruz sobre las complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo II, aumenta el riesgo y la incidencia de su aparición.

1.5.- JUSTIFICACIÓN

La diabetes mellitus tipo II es un problema de salud muy frecuente en nuestro medio con una tendencia a su incremento. Las complicaciones son muy frecuentes debido al pobre impacto de los programas educativos en salud en estos pacientes y al escaso rol promotor del sector salud y de la sociedad en general para modificar los estilos de vida que favorecen la diabetes y sus complicaciones.

Identificar la calidad de vida que genera la enfermedad y diversas situaciones, nos dará pistas importantes para mejorar los servicios de apoyo al paciente diabético de tal forma que al mejorar su percepción también pueda mejorar su adhesión al programa y sus indicaciones en hacer modificaciones en sus estilos de vida.

Consideramos que el estudio será de mucha utilidad a la Comunidad y a los estudiantes del área de la salud como fuente de información y a otras instituciones de la salud para establecer estrategias que apoyadas con la terapéutica farmacológica contribuyan a un mejor control de la salud y bienestar biopsicosocial de los pacientes que conviven con diabetes mellitus tipo II.

Este trabajo de investigación, o también conocido como tesis, se realiza al finalizar una carrera universitaria para la obtención de un título académico y tiene como finalidad de promover el desarrollo de la investigación, que se considera una actividad esencial y permanente para los profesionales de la salud. Esta investigación tiene justificación legal porque se realizó de acuerdo con los requisitos, normas y directivas de la Universidad del Sureste.

Por otro lado, se justifica teóricamente por su aporte a un tema que es de importancia y relevancia en el ámbito de la salud como lo es la prevención de complicaciones en la diabetes tipo II, esto debido a que el estudio se conocerá como el cuidado de enfermería puede repercutir en la prevención de las complicaciones en pacientes diabéticos, de manera tal que se habrá construido un conocimiento que intente mejorar los conocimientos en esta problemática.

En el plano teórico, la investigación también es relevante porque no existe una investigación centrada en la enfermería como principal estrategia para prevenir mejor las complicaciones en pacientes con diabetes tipo II, por lo que se desarrollarán teorías para explicar el comportamiento de estas variables. En el plano práctico, el propósito de la investigación es servir de base y contribuir a otras investigaciones relacionadas, de la misma manera, la obtención de información puede mejorar las estrategias para prevenir las complicaciones de la diabetes tipo II y ayudar a reducir los problemas antes mencionados.

Finalmente como aporte metodológico, esta investigación proporcionará consulta para otras investigaciones posteriores y contribuirá a la investigación en salud, especialmente la investigación en enfermería y la prevención de complicaciones de la diabetes tipo II.

1.6.- DELIMITACION DEL ESTUDIO

(Martinez, 2015) Afirma:

Desde el año 2000, la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. En 2010, esta enfermedad causó cerca de 83 000 muertes en el país.

La diabetes es un padecimiento en el cual el azúcar (o glucosa) en la sangre se encuentra en un nivel elevado. Esto se debe a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina, una hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa (que proviene de los alimentos) en energía. Sin la suficiente insulina, la glucosa se mantiene en la sangre y con el tiempo, este exceso puede tener complicaciones graves.

La diabetes, constituye uno de los principales problemas de salud en México y en el mundo, es una de las primeras causas de infarto, enfermedad vascular cerebral, muerte prematura y la principal responsable de ceguera y amputación no traumática, así como una gran generadora de costos, enfocada al tratamiento de las complicaciones.

Cabe aclarar que las complicaciones pueden prevenirse o reducirse a través de estrategias e intervenciones poblacionales y multisectoriales; y con el empoderamiento del personal de salud y del paciente, adoptando estilos de vida saludable; acceso a tratamientos accesibles y mejor atención integral en los servicios de primer nivel.

Por lo anterior se decidió realizar el presente trabajo con la finalidad de implementar estrategias y medidas para informar y concientizar a la población, específicamente a los pacientes que ya padecen esta enfermedad. Dicha investigación se realizara con la población diabética de

50 a 60 años que habitan el Barrio Santa Cruz, que se encuentra ubicada dentro del Municipio de Frontera Comalapa Chiapas, el cual es considerado una zona rural. Frontera Comalapa es una localidad del estado de Chiapas México. Recientemente fue catalogada como "ciudad" y es cabecera del municipio homónimo. Se localiza en los límites de la Sierra Madre de Chiapas y la depresión central. Sus límites son al norte con el municipio de La Trinitaria, al oeste con Chicomuselo, al sur con Bella Vista y Amatenango de la Frontera y al este con la República de Guatemala. Cuenta con una extensión territorial de 717.90 km² los cuales representan el 5.62% de la superficie de la región Fronteriza y el 0.94% a nivel estatal.

Frontera, es un adjetivo refiriéndose al límite que hace con la República de Guatemala y el término Comalapa proviene de la voz náhuatl: Comalapan En el agua de los comales, que deriva de las voces: Comalli, comal; Atl, agua; y Pan, adverbio de lugar. Pero también se considera que su nombre se debe al recuerdo de la extinta San Juan Comalapa, y está sobre el paraje Cushú, que se encontraba cerca de Tecpan, Guatemala; es decir en la frontera.

Frontera Comalapa es una ciudad que emerge de una combinación de culturas, su desarrollo ha sido paulatino pero constante, con gran apertura al comercio y a la inmigración centroamericana. Es una ciudad que demanda servicios de salud adecuados para el crecimiento poblacional ya que no cuenta con hospitales de segundo o tercer nivel, solo centros de atención primaria.

La colonia Barrio Santa Cruz es una localidad del municipio Frontera Comalapa, en Chiapas, y abarca un área cercana a 11 hectáreas. En Barrio Santa Cruz viven unas 1,050 personas en 271 unidades

habitacionales. Se registran 890 personas por km², con una edad promedio de 25 años y una escolaridad promedio de 8 años cursados.

CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA

2.1 MARCO HISTÓRICO

(Himsworth, 2010) Afirma:

La palabra “diabetes” es un término acuñado por primera vez en el siglo II d.C. por el médico griego Areteo de Capadocia y significa, en el griego clásico, sifón, haciendo referencia a la exagerada emisión de orina o poliuria, secundaria al efecto osmótico de la glucosa a nivel urinario. Por otro lado, la palabra “mellitus”, que significa “sabor miel”, fue descrita por primera vez por el médico inglés Thomas Willis, gracias a las catas que hacía de la orina de sus pacientes (1621-1675), aunque estas descripciones en su sabor ya habían sido descritas en la antigüedad por los griegos clásicos, los egipcios, los chinos, los indios y los persas.

Paracelso (1491-1541) describió que la orina de los pacientes con diabetes contenía una sustancia de color blanco que quedaba como residuo al evaporar la orina, creyendo que se trataba de sal, por lo que pensó que se trataba de una enfermedad causada por la deposición de ésta sobre los riñones, causando poliuria y sed.

El doctor Tomas Syderham (1624-1689), especuló que la diabetes era una enfermedad sistémica de la sangre que aparecía por una digestión defectuosa que hacía que parte del alimento tuviera que ser excretado en la orina. El médico inglés Mathew Dobson (1725-1784) hizo por primera vez estudios en grupos de pacientes e informó que estos pacientes tenían azúcar en la sangre y en la orina y describió los síntomas de la diabetes. Además, en 1775 identificó la presencia de glucosa en la orina.

(Valenti, 2016) Argumenta:

La preocupación por el aumento de los casos de diabetes es actual, pero la diabetes está presente en los seres humanos desde la Antigüedad.

La descripción de la diabetes se evidenció en el Papiro de Ebers (1550 a. C.) y en los Vedas hindúes, quienes describen casos con orina pegajosa y con sabor a miel. En la Antigua Grecia, Apolonio de Menfis (250 a. C.) acuñó el término “diabetes” para señalar a los síntomas como la necesidad de orinar muy frecuente, sed intensa y debilidad extrema. También Aulio Cornelio Celso (30-50 a. C.) sugirió como recomendación para la diabetes a la dieta y el ejercicio, que aún hoy son parte del tratamiento.

Atribuido a un eminente médico sacerdote del templo de Imhotep, en él se relata la existencia de enfermos que adelgazan, tienen hambre continuamente, que orinan en abundancia y se sienten atormentados por una enorme sed; aconseja un tratamiento a base de grasa de ternera, cerveza, hojas de menta y sangre de hipopótamo; como sacerdote, ofrendas y sacrificios a los dioses.

Diez siglos después, en las culturas orientales, mucho más avanzadas que las europeas, se encuentra en la India otra referencia, en el libro de Ayur Veda Susruta (Veda: ciencia) se describe una extraña enfermedad, propia de las personas pudientes, obesos, que comen mucho dulce y arroz y cuya característica más peculiar consiste en tener la orina pegajosa, con sabor a miel y que atrae fuertemente a las hormigas, por lo que la llamaron “madhumeha” (orina de miel). De esta manera Susruta, el padre de la medicina hindú, describió la diabetes mellitus, denominándola “enfermedad de los ricos”, llegando incluso a diferenciar una diabetes que se daba en los jóvenes que conducía a la muerte y otra que se daba en

personas de una cierta edad. También explica que esta enfermedad habitualmente afectaba a varios miembros dentro de una misma familia.

Por aquel entonces, también los médicos chinos habían observado la circunstancia de la orina dulce (atraía a moscas y hormigas) en pacientes que, irremediablemente, morían, al desconocer aún el tratamiento que hubiera podido aliviarles.

En griego, la palabra “diabetes” significa “correr a través” y se refiere a la eliminación exagerada de agua. En aquel momento, se atribuyó la diabetes a una falla en los riñones. Sin embargo, la medicina y la investigación científica básica y aplicada fueron haciendo más descubrimientos que han permitido entender mejor a la diabetes y a sus factores de riesgo, y desarrollar tratamientos para controlar el avance y prevenir sus complicaciones.

John Conrad Brunner (1653-1727) publicó en 1683 que la extirpación del páncreas en el perro producía síntomas de diabetes. Thomas Cawley hizo la observación de que la diabetes mellitus tenía su origen en el páncreas “por la formación de un cálculo” y publicó la primera necropsia practicada en un diabético en *The London Medical Journal* en 1788.

En 1910, el fisiólogo Sir Edward Albert Sharpey-Schafer descubrió que en el páncreas se producía una sustancia que llamó “insulina”. Se abrió la posibilidad de encontrar un tratamiento.

Fueron el canadiense Frederick Banting y su estudiante asistente Charles Best quienes extrajeron insulina del páncreas de perros. Investigaban en uno de los laboratorios de la Universidad de Toronto, que les había proporcionado el profesor J. J. R. Macleod. Inyectaron insulina en otros animales a los que se les había removido el páncreas y observaron que

los niveles de glucosa en sangre bajaban. Otro colega que trabajaba en la misma institución, el médico James Collip, alcanzó el objetivo de preparar extracto pancreático suficientemente puro para poder usarlo en ensayos clínicos.

Al año siguiente, en 1922, un adolescente de 14 años que padecía diabetes severa, Leonard Thompson, fue el primer paciente que recibió la insulina como tratamiento. La insulina se empezó a producir de manera industrial. En 1955, empiezan a estar disponibles determinados fármacos de vía oral que estimulan el páncreas para producir más insulina. Más tarde, se desarrollarían nuevas formas más potentes de este tipo de medicamentos.

En la actualidad se cuenta con una mayor variedad de fármacos que funcionan de manera diferente para bajar el nivel de glucosa en la sangre. En todos los casos, llevar una alimentación saludable es muy importante, al tiempo que lo es también conocer sobre nutrición para entender cómo los alimentos impactarán en el nivel de glucosa en sangre. Esto es parte de lo que se conoce como educación diabetológica, uno de los pilares del tratamiento, junto con la vida saludable, que también incluye la realización de actividad física, y el tratamiento farmacológico que indique cada médico, cuya adherencia por parte del paciente será determinante para el éxito terapéutico.

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

El tema de la Diabetes Mellitus tipo II es tan común en la población en general, y desafortunadamente es un problema muy frecuente con altos índices de complicaciones y mortalidad. Por ello el presente trabajo se enfoca principalmente en dar a conocer las principales complicaciones dicha patología y al mismo tiempo poder prevenirlas. Será guiada por muchas otras investigaciones previas a ésta y de las cuales se presentan algunas a continuación:

NOMBRE DE LA TESIS: “COMPLICACIONES CRÓNICAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE VIDA EN LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO II.”

AUTOR: SOFIA ESTELA PEREZ PEREZ. Y ERICK JOSE PEREZ HERNANDEZ.

AÑO: 2014.

OBJETIVO: Determinar las complicaciones crónicas más frecuentes de la diabetes mellitus tipo II y la calidad de vida que perciben estos pacientes.

DISCUSION: Analizando las características socio demográficas y patológicas de los pacientes con diabetes mellitus tipo II del área urbana del Centro de Salud Sutiava en relación con la calidad de vida de estos mismos, la mayor parte afectada son de género femenino, mayores de 61 años y de ocupación amas de casa, con una escolaridad primaria predominantemente lo cual ha coincidido con la descripción del paciente diabético referida en la literatura.

Dentro de otros factores un gran porcentaje de la población femenina resultaron ser obesas y el tiempo de evolución transcurrido fue menor de 10 años.

Las complicaciones crónicas más frecuentes encontradas fueron en primer lugar la Hipertensión arterial, en segundo lugar Neuropatía y en tercer lugar Nefropatía. Estudios realizados en la ciudad de México D.F¹⁴, sobre calidad de vida de los pacientes diabéticos reportaron que el sexo femenino era el más afectado, con mayor frecuencia de obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, retinopatía, nefropatía, neuropatía periférica y cardiopatía isquémica.

Comparando ambos resultados se encuentra cierta similitud ya que ambos países pertenecen a población latinoamericana, sin embargo, en nuestro país la atención primaria no cuenta con los métodos diagnósticos esenciales para la práctica médica.

La calidad de vida de estos pacientes resulto ser regular, similar con el estudio mexicano que resulto poco afectado, encontramos esto debido a que nuestro país no tiene el nivel de desarrollo adecuado por lo cual no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer las demandas de salud en la población.

CONCLUSIONES: Los pacientes estudiados con diabetes mellitus tipo II, son personas de la tercera edad que viven en condiciones de pobreza y hacinamiento. Las complicaciones crónicas más frecuentes de los pacientes diabéticos fueron hipertensión arterial, neuropatía, nefropatía y enfermedad cardiaca. Siendo mayor la frecuencia de complicaciones en el sexo femenino. La tercera parte de los pacientes diabéticos encuestados presentan mala calidad de vida debido a la cronicidad de la diabetes y sus implicaciones en los cuidados que amerita. La mala calidad de vida es a

consecuencia de las complicaciones como: neuropatía, nefropatía, enfermedad cardíaca, dislipidemia, pie diabético y retinopatía. No se encontró asociación en la aparición de hipertensión arterial y enfermedades dermatológicas como factor de mala calidad de vida.

NOMBRE DE LA TESIS:“CUIDADO DE ENFERMERÍA Y PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2.”

AUTOR: Eduardo Alex Rivas Merma

AÑO: 2020.

OBJETIVO:Determinar la relación que existe entre el cuidado de enfermería y la prevención de complicaciones en pacientes diabéticos tipo 2, atendidos en el servicio de endocrinología del Hospital de Emergencias Grau, Lima.

RESULTADOS:El 48.94% de los participantes perciben el cuidado de enfermería de manera regular; así mismo, el 48,94% en la dimensión técnica, 47.87% en el aspecto humanizado y 50.00% en cuanto a la actitud profesional. Por otro lado, la prevención de complicaciones de la diabetes tipo 2, fue regular según el 45.74%, asimismo en el caso de las complicaciones agudas 46.81% y en la prevención en las complicaciones graves 45.74%.

DISCUSION:A través de los resultados obtenidos se encontró que el 48.94% manifiesta que el cuidado de enfermería se desarrolla en un nivel regular, el 28.72% menciona que este cuidado se da en un nivel bueno y el 22.34% refiere que el cuidado de enfermería se desarrolla en un nivel malo. Así mismo el 45.74% presenta una prevención de las

complicaciones de nivel regular, el 35.11% presenta una prevención buena y el 19.15% presenta una prevención mala. Por otra parte, se concluyó que existe relación significativa entre el cuidado de enfermería y la prevención de complicaciones en pacientes diabéticos tipo 2, atendidos en el servicio de Endocrinología, Hospital de Emergencias Grau 2019, según la correlación de Spearman de 0.682 representado este resultado como moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01.

Estos resultados comparan con la investigación realizada por Ramírez N, Cortés B, Galicia, R. (2016) En, México, donde concluyó que el manejo tipo 2 y sus cuidadores, así como el conocimiento es importante para que la calidad de vida sea mejor asimismo se reducen las complicaciones y riesgos al evitar tener que reingresar a los hospitales. Existe una concordancia con la presente investigación donde observamos como el cuidado de enfermería trasciende importantemente en prevenir las complicaciones del paciente diabético. En cuanto a las complicaciones, la atención profesional también ha mostrado una relación significativa con esta variable, lo que indica que su instrucción y manejo son necesarios para prevenir complicaciones en el paciente.

CONCLUSIONES: Existe relación significativa entre el cuidado del profesional de enfermería y la prevención de complicaciones en pacientes diabéticos tipo 2. Existe relación significativa entre el cuidado de enfermería y prevención de complicaciones en pacientes diabéticos tipo 2, servicio de endocrinología del Hospital de Emergencias Grau Lima, 2019. Según la correlación de Spearman de 0.682 representado este resultado como una correlación moderada directa y estadísticamente significativa.

NOMBRE DE LA TESIS:COMPLICACIONES CRÓNICAS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2.

AUTOR: Inés Lázaro Carrasco Hernández.

AÑO: 2017.

OBJETIVO:El presente trabajo tiene como principal objetivo el estudio en profundidad de las complicaciones crónicas derivadas en la diabetes, especialmente aquellas surgidas como consecuencia de un diagnóstico tardío, y que pueden repercutir gravemente en la calidad de vida de los pacientes. Para ello, el trabajo comienza con una introducción en la que se describe la enfermedad, los mecanismos implicados en su desarrollo, las complicaciones crónicas que desencadena la diabetes y finalmente la conclusión de la revisión.

RESULTADOS Y DISCUSION:Las complicaciones crónicas de la diabetes comprenden trastornos microcirculatorios y macrocirculatorias. Las complicaciones microcirculatorias se producen en tejidos corporales independientes de la insulina; es decir, tejidos que no requieren la presencia de insulina para que la glucosa ingrese en las células tisulares. Esta independencia de insulina probablemente implica que la concentración de glucosa en muchos de estos tejidos es similar a la concentración sanguínea. La hiperglucemia crónica es el factor más importante asociado con las complicaciones de la diabetes. En la diabetes de larga evolución no controlada es habitual el desarrollo de estas complicaciones, así como lesiones directas del sistema nervioso periférico.

CONCLUSIONES:Por todas las complicaciones mencionadas, la diabetes representa un problema sanitario y socioeconómico de gran importancia a nivel mundial, afectando recientemente a población cada vez más joven.

Los profesionales de la salud deben trabajar unidos para conseguir un diagnóstico precoz, prevenir riesgos y disminuir las complicaciones que conlleva esta enfermedad.

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad con elevada morbimortalidad. Sin embargo, su diagnóstico temprano y la prevención de los factores de riesgo asociados (hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, tabaquismo), retrasan la aparición de las complicaciones crónicas y todos los riesgos que conllevan, promoviendo una calidad de vida más saludable de los pacientes diabéticos.

2.3. MARCO TEÓRICO

2.3.1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL PÁNCREAS

(Torres, 2010) Afirma:

El páncreas es una glándula digestiva elongada (12-15 cm) de consistencia blanda y coloración gris rosada, que se sitúa cerca del plano transpilórico, en una posición más o menos transversal, a lo largo de la pared posterior del abdomen, por detrás del estómago. El mesocolon transversal se inserta en su borde anterior.

El páncreas (del griego pankreas, “pan dulce”) es una glándula exocrina y endocrina, la cual produce secreciones externas (jugo pancreático) que se introducen en el duodeno a través del conducto pancreático y secreciones internas (glucagón e insulina) que penetran en la sangre.

El páncreas se sitúa en la región epigástrica y en el hipocondrio izquierdo; la porción derecha se encuentra a la altura de los cuerpos vertebrales L1 a L3. Este órgano se compone de cabeza, cuello, cuerpo y cola y su forma se parece algo a la pipa de tabaco invertida y curva. La cara derecha (cabeza) suele quedar bajo el plano transpilórico, y la izquierda (cola) ligeramente por encima de este plano. Se localiza posterior a la bolsa omental, en el lugar donde se forma la mayor parte del lecho gástrico.

La cabeza del páncreas está dentro de la curva del duodeno y abrazada por ella. Posee una prolongación que se denomina proceso uncinado (significa “con forma de gancho” en latín), la cual se extiende cranealmente y a la izquierda y queda posterior a los vasos mesentéricos superiores; en este lugar se apoya sobre la aorta, situada en el plano posterior.

El páncreas es la mayor de las glándulas digestivas, realiza una serie de funciones tanto exocrinas como endocrinas. Aunque el órgano recibe su nombre de griego pankreas, que significa "toda carne," el páncreas es, en realidad, un complejo órgano lobulado con distintos componentes exocrinos y endocrinos. La porción exocrina, que produce enzimas digestivas, constituye el 80% al 85% del páncreas. El tejido pancreático exocrino drena múltiples pequeños conductos lobulares, que desembocan en una cañería individual y generalmente, un único conducto accesorio. La porción endocrina está compuesta por aproximadamente 1 millón racimos de células, los islotes de Langerhans. Las células de los islotes segregan insulina, glucagón y somatostatina, y constituyen sólo el 1% al 2% del órgano. Toman parte en la homeostasis de la glucosa, así como participar en el control de la motilidad gastrointestinal superior.

El páncreas adulto es un órgano retroperitoneal orientado transversalmente extendiéndose desde el bucle "C" del duodeno hasta el hilio del bazo. En promedio, el páncreas mide 20 cm de largo y pesa 90 grs en los hombres y 85 grs en las mujeres. La vasculatura adyacente al páncreas puede utilizarse para separar el páncreas en cuatro partes: la cabeza, cuello, cuerpo y cola.

- **La cabeza** descansa en el plano posterior de la vena cava inferior, vasos renales derechos y vena renal izquierda. El conducto biliar descansa, en su camino en el duodeno, en un surco de la cara posterosuperior de la cabeza del páncreas y, a veces, está incluido dentro de ella.
- **El cuello** del páncreas mide alrededor de 2 cm de longitud y se continúa con la porción superior izquierda de la cabeza, uniéndose de manera casi imperceptible al cuerpo del páncreas. El cuello tiene un surco en la cara posterior para los vasos mesentéricos

superiores. La cara anterior está cubierta por peritoneo y se encuentra muy próxima al píloro del estómago. La vena mesentérica superior se une a la vena esplénica por detrás del cuello del páncreas formando la vena porta.

- **El cuerpo** de páncreas se extiende algo cranealmente a medida que se dirige a la izquierda, cruzando la aorta y las vértebras lumbares superiores, por detrás de la bolsa omental. El cuerpo tiene forma ligeramente triangular, en una sección transversal, y posee tres caras: anterior, posterior e inferior. La cara anterior está cubierta por peritoneo y forma parte del lecho del estómago; en ella se inserta el mesocolon transversal. La cara posterior carece de recubrimiento peritoneal y se halla en contacto con la aorta, arteria mesentérica superior, glándula suprarrenal izquierda y riñón izquierdo con los vasos correspondientes.
- **La cola** como última parte del páncreas pero no menos importante, la cola, de localización intraperitoneal se encuentra íntimamente relacionada con el hilio esplénico y transita en conjunto con los vasos esplénicos en el ligamento esplenorrenal.

2.3.1.1. FUNCIONES DEL PÁNCREAS

(Steven, 2019) Comenta:

El páncreas tiene funciones digestivas y hormonales:

Las enzimas que secreta la glándula exocrina en el páncreas ayudan a descomponer los carbohidratos, las grasas, las proteínas y los ácidos en el duodeno. Estas enzimas bajan por el conducto pancreático hasta el

conducto colédoco, en estado inactivo. Cuando entran al duodeno, se activan. El tejido exocrino también secreta un bicarbonato para neutralizar el ácido del estómago en el duodeno. Esta es la primera sección del intestino delgado.

Las estructuras principalmente responsables de la función del páncreas son las glándulas endocrinas y exocrinas. Las glándulas exocrinas sintetizan enzimas digestivas pancreáticas inactivas (zimógenos), los cuales se liberan en los sistemas glandular y de conductos pancreáticos. Al llegar al duodeno, los zimógenos son activados por enzimas proteolíticas, transformándose en peptidasas, amilasas, lipasas y nucleasas activas que cumplen el rol de seguir digiriendo los alimentos que ingresan al intestino delgado desde el estómago.

La función endocrina del páncreas es desempeñada por los islotes pancreáticos de Langerhans (o simplemente, islotes de Langerhans). Estas glándulas endocrinas secretan hormonas directamente al torrente sanguíneo y están constituidas por tres tipos de células principales (alfa, beta y delta). No te preocupes, no necesitas conocer todo el alfabeto griego para comprender las funciones del páncreas. De una manera fácil de explicar, las células beta secretan insulina, las alfas liberan glucagón y las deltas producen somatostatina. Estas hormonas son cruciales en la regulación del metabolismo de la glucosa y en las funciones gastrointestinales.

Las hormonas principales secretadas por la glándula endocrina en el páncreas son la insulina y el glucagón. Estas hormonas regulan la concentración de glucosa en la sangre, y la somatostina, que impide la secreción de insulina y glucagón.

2.3.2. DIABETES MELLITUS

(OMS, 2008) Afirma:

Es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la glucosa en sangre elevada (hiperglucemia). Se asocia con una deficiencia absoluta o relativa de la producción y/o de la acción de la insulina.

(NOM-015, 2010) Define:

Enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, y que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, proteínas y grasas.

(Bloomgarden, 2009) Explica:

La diabetes mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia crónica, debida a un defecto en la secreción de la insulina, a un defecto en la acción de la misma, o a ambas. Además de la hiperglucemia, coexisten alteraciones en el metabolismo de las grasas y de las proteínas. La hiperglucemia sostenida en el tiempo se asocia con daño, disfunción y falla de varios órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos.

Este trastorno crónico de base genética se caracteriza por tres tipos de manifestaciones:

- a) Un síndrome metabólico consistente en hiperglicemia, glucosuria, polifagia, polidipsia, poliuria y alteraciones en el metabolismo de los

lípidos y de las proteínas como consecuencia de un déficit absoluto o relativo en la acción de la insulina.

- b) Un síndrome vascular que puede ser macroangiopático y microangiopático y que afecta todos los órganos, pero especialmente el corazón, la circulación cerebral y periférica, los riñones y la retina.
- c) Un síndrome neuropático que puede ser a su vez autónomo y periférico.

2.3.2.1. Insulina

La insulina es una hormona secretada por el páncreas participa en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. La producción deficiente de insulina y/o la disminución en la respuesta de los tejidos y órganos periféricos a su acción constituyen las principales bases etiopatogénicas de la diabetes mellitus. La insulina se ha podido sintetizar para su uso farmacológico y forma parte importante dentro de las opciones terapéuticas vigentes para el manejo de la diabetes mellitus.

Es una pequeña proteína con peso molecular de 5808 en los seres humanos. Contiene 51 aminoácidos dispuestos en dos cadenas (A y B) unidos por puentes disulfuro; existen diferencias de especie en los aminoácidos de ambas cadenas.

2.3.3. CLASIFICACIÓN DE LA DIABETES

Incluye diversos tipos de diabetes y otras categorías de intolerancia a la glucosa.

2.3.3.1. Diabetes tipo I

Conocida como “diabetes juvenil”, por lo general aparece antes de los 35 años, también se le conoce como “diabetes insulino dependiente” porque depende de insulina para poder metabolizar los alimentos. En este tipo de diabetes el páncreas no produce insulina o produce muy poca.

Su característica distintiva es la destrucción autoinmune de la célula β , lo cual ocasiona deficiencia absoluta de insulina, y tendencia a la cetoacidosis. Tal destrucción en un alto porcentaje es mediada por el sistema inmunitario, lo cual puede ser evidenciado mediante la determinación de anticuerpos: Anti GAD (antiglutamato decarboxilasa), anti insulina y contra la célula de los islotes, con fuerte asociación con los alelos específicos DQ-A y DQ-B del complejo mayor de histocompatibilidad (HLA). La DM1 también puede ser de origen idiopático, donde la medición de los anticuerpos antes mencionados da resultados negativos.

2.3.3.2. Diabetes tipo II

Es la forma más común de diabetes y por lo general se desarrolla en las personas mayores de 40 años. En esta forma de diabetes, lo que sucede es que las células del cuerpo desarrollan resistencia gradual a los efectos de la insulina. La causa de este tipo de diabetes está relacionada con la obesidad y con factores genéticos. Tres de cada cuatro personas que padecen este tipo de diabetes, sufren de sobrepeso.

Este tipo de Diabetes con frecuencia se asocia a obesidad o incremento en la grasa visceral. Muy raramente ocurre cetoacidosis de manera espontánea. El defecto va desde una resistencia predominante a la insulina, acompañada con una deficiencia relativa de la hormona, hasta un progresivo defecto en su secreción.

2.3.3.3. Diabetes Gestacional

Agrupada específicamente la intolerancia a la glucosa detectada por primera vez durante el embarazo. La hiperglucemia previa a las veinticuatro semanas del embarazo, se considera diabetes preexistente no diagnosticada. Es la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se detecta por primera vez durante el embarazo, ésta traduce una insuficiente adaptación a la insulinoresistencia que se produce en la gestante.

2.3.4. CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II.

(Lindstrom, 2009) Argumenta:

Tradicionalmente los siguientes se han considerado algunos factores de riesgo y causas:

- Alta ingesta de grasas, particularmente saturadas (mas de 30% del aporte calórico/día).
- Elevada ingesta alcohólica.
- Sedentarismo.
- Grupos étnicos de alto riesgo: afroamericanos, latinos y afroasiáticos.
- Edad mayor de 45 años o 30 años con un IMC mayor de 25 kg/m².
- Antecedentes familiares de DM2 en familiares de primer grado.
- Obesidad visceral.
- Hipertensión arterial.
- Síndrome de ovario poli quísticos (SOP).

- Diabetes gestacional.
- Madres de hijo con peso mayor de 4 kg al nacer.
- Hipogonadismo masculino.
- Dislipidemia, particularmente triglicéridos mayor de 150 mg/dL y HDL-C menor de 35 mg/dL.
- Otros: Acantosis nigricans, macrosomia, hiperandrogenismo, adrenarquia temprana, menopausia precoz, multiparidad, bajo peso al nacer, antecedentes de polihidramnios, mortinato o recién nacido fallecido en la primera semana, gota, esteatosis hepática.

(Castro, 2016) Menciona:

En la actualidad después de varias revisiones por los Comités de Expertos y en la necesidad de identificar en la población aquellos individuos que están en mayor riesgo de desarrollo de DM2, se han establecido los siguientes factores, los cuales se clasifican en modificables y no modificables.

2.3.4.1. Factores No modificables

- Raza e historia familiar: La DM2 definitivamente se acompaña de una gran predisposición genética. Aquellos individuos con un padre diabético tienen un 40% de posibilidad de desarrollar la enfermedad, si ambos padres son diabéticos el riesgo se eleva a un 70%. Hay una concordancia del 70% en gemelos idénticos. Hasta el momento se han identificado más de 20 genes, entre millones de potenciales cambios genéticos, asociados a la DM2 y la mayoría de ellos están vinculados a la disfunción de célula beta.

- Edad y sexo: A medida que avanzamos en edad aumenta el riesgo de DM2, sin embargo en los últimos años se ha visto una disminución en la edad de aparición en adultos jóvenes y adolescentes. En general, la prevalencia de DM2 es mayor en mujeres que en hombres.
- Historia de diabetes gestacional y síndrome de ovarios poliquísticos (SOP): Las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de DM2, décadas después de su embarazo, por lo tanto deben ser controladas adecuadamente para prevenir la aparición de la enfermedad.

2.3.4.1. Factores Modificables

- Sobrepeso y obesidad: Representan los más importantes para el desarrollo de DM2. La prevalencia de la obesidad va en aumento progresivo a nivel mundial y muy especialmente en Latinoamérica.
- Sedentarismo: Es bien conocido que la inactividad física es un factor predictor independiente de DM2, tanto en hombres como en mujeres, por lo que sujetos habitualmente activos tienen una menor prevalencia de diabetes.
- Factores dietéticos: La alta ingestión de calorías, el bajo consumo de fibra dietética, la sobrecarga de carbohidratos y el predominio de la ingesta de grasas saturadas sobre las poliinsaturadas, pueden predisponer a DM2.
- Ambiente intrauterino. Se ha determinado que sujetos con bajo peso al nacer así como aquellos cuyas madres presentaron diabetes gestacional tienen un riesgo aumentado de DM2.

- Inflamación: Los estados inflamatorios que acompañan a la obesidad visceral que incluyen elevación de varios marcadores séricos.
- Hipertensión arterial (HTA): Tanto los pacientesprehipertensos como los hipertensos presentan unmayor riesgo de desarrollar DM2, atribuido a unamayor posibilidad de tener resistencia a la insulina.

2.3.5. CUADRO CLINICO DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II

(Safak, 2008) Argumenta:

La diabetes tipo 2 es prácticamente asintomática en las fases iniciales. Esto supone un retraso en su diagnóstico, incluso de varios años, y se calcula que hasta un 50% de personas con diabetes mellitus tipo 2 permanecen sin diagnosticar en este momento. Esto hace que hasta un 20% de las personas con este tipo de diabetes presenten signos de complicaciones en el momento del diagnóstico. Por este motivo, la diabetes mellitus tipo 2 hay que buscarla de forma específica en las personas con riesgo.

Los síntomas se deben a la hiperglucemia, o debido al daño que esta enfermedad causa en los distintos órganos del cuerpo (ojos, riñones, sistema cardiovascular, sistema nervioso) a lo largo del tiempo. Entre los síntomas de la diabetes tipo 1 y 2 están:

- Polidipsia.
- Poliuria o polaquiuria.

- Polifagia.
- Pérdida de peso.
- Debilidad y somnolencia.
- Cambios en la visión o visión borrosa.
- Náuseas y vómito.
- Cansancio.
- Infecciones frecuentes o de curación lenta.

2.3.6. DIAGNÓSTICO

(Ruiz, 2011)Menciona:

Los nuevos criterios se basan en niveles menores de glucosa con la finalidad de iniciar precozmente el tratamiento y reducir las complicaciones. Se consideran valores normales de glucemia en ayunas menores a 100 mg/dLy de 140 mg/dL después de dos horas de una carga de glucosa. Las alteraciones del metabolismo de la glucosa previas a la aparición de la diabetes, están definidas como:

- Glucosa alterada en ayunas (GAA): cuando su valor se encuentra entre 100mg/dL y 125 mg/ dL.
- Intolerancia a la prueba de glucosa (ITG) a las dos horas con cifras entre 140 y 199 mg/dL, después de una carga de 75 gramos de glucosa.

2.3.6.1. Glucosa Plasmática en Ayunas (GPA)

Es la prueba de elección para el diagnóstico, aunque no basta una sola determinación. Si el paciente no presenta hiperglucemia inequívoca con descompensación metabólica aguda, el diagnóstico tiene que confirmarse

repitiendo la determinación de glucemia en diferentes días. Se toma una muestra de sangre después de una noche de ayuno. Los resultados se interpretan de la siguiente manera:

- Menos de 100 mg/dL (5.6 mmol/L) se considera normal.
- Entre 100 y 125 mg/dL (5.6 a 6.9 mmol/L) se diagnostica como prediabetes.
- 126 mg/dL (7 mmol/L) o más en dos pruebas distintas se diagnostica como diabetes.

2.3.6.2. Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa (PTGO)

No debe realizarse a personas con glucemia en ayunas iguales o mayores a 126 mg /dL o con glucemia al azar igual o superior a 200 mg/dL en los que basta una segunda determinación para confirmar el diagnóstico. Ha de efectuarse con una carga que contenga el equivalente a 75 g de glucosa anhidra, diluidos en 300 ml de agua, a temperatura ambiente, ingeridos en un periodo no mayor de cinco minutos.

Esta prueba se usa con menos frecuencia que las otras, excepto durante el embarazo. Deberás ayunar durante la noche y luego beber un líquido azucarado en el consultorio del médico. Los niveles de glucosa en la sangre se analizan periódicamente durante las próximas dos horas. Los resultados se interpretan de la siguiente manera:

- Menos de 140 mg/dL (7.8 mmol/L) se considera normal.
- Entre 140 y 199 mg/dL (7.8 mmol/L y 11.0 mmol/L) se diagnostica como prediabetes.
- 200 mg/dL (11.1 mmol/L) o más después de dos horas indica diabetes.

2.3.6.3. Hemoglobina Glicosilada (HbA1c)

Esta prueba de sangre indica tu nivel promedio de glucosa en la sangre en los últimos dos o tres meses. Los resultados se interpretan de la siguiente manera:

- Por debajo del 5.7 % se considera normal.
- Entre 5.7 y 6.4 % se diagnostica como prediabetes.
- 6.5 % o más en dos pruebas distintas se considera diabetes.

2.3.7. TRATAMIENTO

(Fernandez, 2019)Explica:

La diabetes es una enfermedad crónica que requiere cuidado médico continuo y compromiso del paciente para prevenir las complicaciones agudas y reducir el riesgo para complicaciones a largo plazo. Es una patología compleja que necesita enfrentarse a varios inconvenientes más allá del control glucémico.

La diabetes tipo 2 se encuentra entre los primeros 10 lugares como causa de consulta y mortalidad en la población adulta, representando una patología onerosa tanto para el sistema de salud como para el paciente y la sociedad.

Teniendo en cuenta que los pacientes con diabetes tipo 2 constituyen un grupo heterogéneo, las estrategias terapéuticas deberían individualizarse para lograr los objetivos para cada paciente en particular. La disponibilidad de fármacos se encuentra en expansión, permitiendo al equipo de salud considerar diferentes factores para la elección de los mismos. Es

importante tener en cuenta que la primera estrategia terapéutica se encuentra representada por los cambios en el estilo de vida: alimentación adecuada y actividad física, que deben ser instituidos antes o concomitantemente con la farmacoterapia. El tratamiento debe ser escalonado, en la mayoría de los casos con asociación de fármacos, acorde a sus mecanismos de acción. Las recomendaciones para el tratamiento de la diabetes tipo 2 incluyen:

- Iniciar tratamiento con intervenciones en el estilo de vida y metformina al momento del diagnóstico de la diabetes, excepto que la metformina se encuentre contraindicada
- En pacientes con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2 con importante sintomatología o glucemias o HbA1c muy elevadas, considerar la insulinoterapia desde el inicio.
- Si la monoterapia oral a dosis máximas no logra mantener los objetivos de glucemia y HbA1c después de 3 a 6 meses, se debería agregar una segunda droga oral, un agonista de los receptores de GLP-1 o insulina.

Los objetivos del tratamiento de la diabetes tipo 2 son:

- Mejorar el metabolismo de la glucosa, proteínas y grasas.
- Obtener un estado nutricional y un peso corporal adecuados.
- Prevenir la aparición de complicaciones agudas y crónicas.
- Adecuar el tratamiento a las actividades del paciente.

El tratamiento de la diabetes tipo 2 incluye:

- Educación

- Plan alimentario
- Actividad física
- Tratamiento farmacológico

2.3.7.1. Educación

Como la diabetes es una enfermedad crónica, es fundamental que el paciente reciba educación diabetológica adaptada a sus posibilidades durante todo el transcurso de su enfermedad. La educación representa el proceso que permite conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para el automanejo de la diabetes. El objetivo es que el paciente participe en su tratamiento colaborando con los profesionales de la salud para mejorar los resultados del tratamiento y su calidad de vida.

2.3.7.2. Plan alimentario (Dieta)

El plan alimentario es una parte fundamental del tratamiento integral y del autocuidado del paciente con diabetes tipo 2. El plan alimentario debe ser individualizado, ajustado a la edad, presencia de comorbilidades, características culturales y del estilo de vida, costos y preferencias del paciente. Debe incluir todos los grupos alimentarios, asegurando un ingreso adecuado de macro y micronutrientes. Se debe desalentar el consumo de alcohol, restringir la ingesta de sodio a menos de 2400 mg/día (6 g de cloruro de sodio). Tanto la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), como la Agencia Europea de Medicaciones (EMA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en nuestro país, han aprobado el uso de edulcorantes en las personas con diabetes tipo 2.

2.3.7.3. Actividad Física

Los estudios epidemiológicos indican que los individuos que desarrollan un estilo de vida activo tienen menos probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2; además el efecto protector de la actividad física es mayor en los que tienen predisposición a desarrollar la enfermedad.

2.3.7.4. Tratamiento Farmacológico

El tratamiento farmacológico se inicia de manera concomitante con los cambios de los hábitos de vida, y antes de prescribir los antidiabéticos orales (ADO) se deberá considerar:

- Características clínicas y fisiopatológicas del paciente
- Antigüedad de la enfermedad
- Edad del paciente
- Peso corporal
- Síntomas
- Efectividad para disminuir la glucemia
- Efectos extra glucémicos que pueden reducir la aparición de complicaciones
- Complicaciones crónicas o enfermedades intercurrentes

Finalmente los fármacos más utilizados en nuestro medio para el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo II son los siguientes:

- Biguanidas (Metformina)
- Meglitinidas
- Incretinas
- Tiazolidinedionas
- Sulfonilureas

2.3.8. COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS TIPO II

(Bendezu, 2016) Afirma:

Las complicaciones crónicas pueden dividirse en vasculares y no vasculares. A su vez, las complicaciones vasculares se subdividen en: Microangiopatía (retinopatía, neuropatía y nefropatía). Macroangiopatía (cardiopatía isquémica, enfermedad vascular periférica y enfermedad cerebrovascular). Las complicaciones no vasculares comprenden problemas como gastroparesia, disfunción sexual y afecciones de la piel.

El riesgo de complicaciones crónicas aumenta con la duración de la hiperglicemia; suelen hacerse evidentes en el transcurso del segundo decenio de la hiperglicemia.

2.3.8.1. COMPLICACIONES CRÓNICAS MICROVASCULARES

2.3.8.1.1. Retinopatía

Los pacientes diabéticos corren el riesgo de padecer cataratas y glaucoma, pero la retinopatía es la enfermedad ocular más frecuente asociada con la diabetes. Se trata de una enfermedad vascular degenerativa de la retina caracterizada por un aumento anormal de la permeabilidad vascular retiniana, formación de microaneurismas y neovascularización con hemorragias, cicatrización y desprendimiento retinianos asociados. El embarazo, la pubertad y la cirugía por cataratas pueden acelerar la retinopatía.

Los altos niveles de glucemia hacen que las paredes de los vasos sanguíneos se vuelvan más permeables y frágiles, esto ocasiona el escape de exudados al humor vítreo. En un estadio avanzado, la proliferación de nuevos y frágiles vasos sanguíneos produce hemorragias en el humor vítreo. La sangre en el humor vítreo lo vuelve opaco causando disminución de la visión, en general, de forma brusca.

Los principales síntomas de esta enfermedad son: visión borrosa, pérdida gradual de visión, sombras o zonas de visión perdidas y mala visión nocturna. El paciente no suele darse cuenta de la enfermedad hasta que el daño ya es irreversible.

2.3.8.1.2. Nefropatía Diabética

Se trata de un proceso progresivo en el que, en un primer momento, aparecen lesiones funcionales (hiperfiltración) y, posteriormente, lesiones estructurales. El aumento del filtrado glomerular se produce por un doble mecanismo: un aumento de presión de filtración porque se eleva el flujo sanguíneo del glomérulo, manteniéndose el calibre de la arteriola aferente mayor que de la eferente, y aumento de la constante de filtración porque los glomérulos se hipertrofian, lo que supone un incremento de la superficie de membrana filtrante. Estos cambios son inducidos por la hiperglucemia, que estimula la síntesis de factores de crecimiento.

Las lesiones estructurales de la nefropatía diabética afectan al glomérulo, al túbulo proximal y a la arteriola, condicionando un síndrome nefrótico o glomerulonefrítico. Es importante resaltar las alteraciones de las sustancias vasoactivas, como son las modificaciones del sistema renina angiotensina o de las prostaglandinas, entre otros, que presenta la mayoría de los pacientes diabéticos. Se produce un desequilibrio entre los sistemas dilatador y vasoconstrictor, resultando un predominio de los

primeros ocasionando un riñón hiperfiltrante y un aumento de lapresión intraglomerular. La presión intraglomerular parece ser el factor decisivo en el aumento de la expansión mesangial y el daño posterior de algunos glomérulos.

El daño irreversible de los mismos lleva a modificaciones hemodinámicas del resto, estableciéndose un mecanismo de auto perpetuación de la lesión, independiente de las modificaciones metabólicas.

2.3.8.1.3. Neuropatías

Las neuropatías periféricas diabéticas se asocian con dos tipos de alteraciones patológicas. La primera de ellas consiste en un aumento del espesor de las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el nervio afectado, lo que permite pensar que la isquemia vascular desempeña un papel patogénico importante en estos trastornos nerviosos. La segunda consiste en un proceso de desmielinización segmentaria que afecta a las células de Schwann. Este proceso desmielinizante se acompaña de una disminución de la velocidad de conducción nerviosa.

Las neuropatías periféricas diabéticas no representan una entidad clínica única, ya que las manifestaciones clínicas de estos trastornos varían según la localización de la lesión. Se pueden clasificar en neuropatías somáticas y neuropatías del sistema nervioso autonómico.

La neuropatía es la complicación de la DM que más afecta a la calidad de vida de los pacientes; la mayoría de ellos la desarrolla tarde o temprano, aunque su frecuencia es mayor conforme la enfermedad avanza. Es una complicación silenciosa, pero cuando se presentan síntomas, éstos suelen ser incapacitantes porque traducen daño extenso y avanzado.

- Neuropatías somáticas. La forma más frecuente de neuropatía periférica está representada por una polineuropatía simétrica distal en la que la alteración funcional presenta una distribución denominada “en medias y guantes” por afectar sobre todo a los extremos de las extremidades superiores e inferiores.

En general se observa un compromiso sensitivo somático bilateral y simétrico inicial asociado con disminución de las percepciones vibratorias, algica y térmica, sobre todo en las extremidades inferiores. Además de provocar diversos inconvenientes asociados con la pérdida de las funciones sensitiva o motora, las lesiones del sistema nervioso periférico predisponen al desarrollo de otras complicaciones en el paciente diabético. La pérdida de la sensación táctil y posicional aumenta el riesgo de caídas.

La disminución de la percepción de la temperatura y el dolor aumenta el riesgo de quemaduras y lesiones graves de los pies (pie diabético). La neuropatía diabética dolorosa afecta las neuronas somatosensitivas que conducen los impulsos algicos. Este trastorno se asocia con hipersensibilidad táctil superficial y en raros casos con una sensación de “ardor” intensa, sobre todo durante las noches, que puede incapacitar al paciente tanto física como psicológicamente.

- Neuropatía autonómica: Las neuropatías autonómicas comprenden trastornos funcionales de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Estos trastornos pueden acompañarse de alteraciones de la función vasomotora, disminución de las respuestas cardíacas, alteraciones de la motilidad del tracto gastrointestinal, evacuación vesical incompleta y disfunción sexual.

Las alteraciones de los reflejos vasomotores pueden provocar mareos y síncope al pasar del decúbito dorsal a la posición erecta. El vaciamiento incompleto de la vejiga predispone a la estasis urinaria y la infección vesical, y aumenta el riesgo de complicaciones renales.

2.3.8.2. COMPLICACIONES CRÓNICAS MACROVASCULARES

(Guerrero, 2019) Argumenta:

La enfermedad vascular puede afectar a todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Las arterias afectadas del corazón pueden conducir en primer lugar a dolor en el pecho, a una angina o incluso a un ataque cardíaco. Las arterias bloqueadas en las piernas pueden provocar problemas con la circulación y la capacidad de caminar. Y las arterias bloqueadas en el cerebro pueden llevar a un AIT (ataque isquémico transitorio) o ACV.

La enfermedad vascular es de dos a cuatro veces más común en la gente con diabetes. Es causada por el endurecimiento y obstrucción de las arterias (aterosclerosis). Este hecho es más frecuente en diabéticos, de aparición más temprana y con lesiones arteriales más severas, ya que, cuando la glucosa en sangre está alta de forma crónica, se ven alteradas las paredes internas de los vasos sanguíneos, lo que disminuye su elasticidad. Los niveles de azúcar elevados en sangre también causan aterosclerosis al promover la formación de placas. La alta presión sanguínea, el colesterol y los triglicéridos altos, y fumar incrementan adicionalmente este riesgo. Hasta el azúcar en sangre incrementada moderadamente (como en la prediabetes) incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca.

2.3.8.2.1. Enfermedad arterial coronaria (EAC)

La enfermedad arterial coronaria (EAC) se trata de la enfermedad cardiovascular más común. La EAC y sus complicaciones, tales como la arritmia, la angina de pecho y el ataque cardíaco, son importantes causas de muerte en los pacientes diabéticos. La causa más frecuente de EAC es la aterosclerosis dentro de las arterias que riegan el corazón.

La formación de una placa de ateroma comienza en la capa más interna de la arteria. El exceso de partículas de lipoproteína de baja densidad (LDL) en el torrente sanguíneo se incrusta en la pared de la arteria. En respuesta, los monocitos llegan al sitio de la lesión, se adhieren y el cuerpo formado es llevado al interior de la pared de la arteria por las quimioquinas. Una vez dentro, se apiñan, y se forman las “células espumosas” reunidas en la pared del vaso sanguíneo formando un cúmulo de grasa. Este es el inicio de la formación de la placa de ateroma (placa vulnerable). Esta capa se inflama por la conversión de los monocitos en macrófagos. Si no hay muchas lipoproteínas, los macrófagos captan todas las que se han oxidado y se modera la reacción inflamatoria; sin embargo, si son muchas los macrófagos se transforman en las células espumosas antes citadas. Se han identificado dos tipos de placa: placa dura y placa vulnerable.

2.3.8.2.2. Enfermedad Arterial Periférica (EAP)

Se trata de un conjunto de síndromes, agudos o crónicos, generalmente derivados de la presencia de una enfermedad arterial oclusiva, que condiciona un insuficiente flujo sanguíneo a las extremidades. En la gran mayoría de las ocasiones, el proceso patológico subyacente es la enfermedad arteriosclerótica, y afecta preferentemente a la vascularización de las extremidades inferiores.

Se denomina pie diabético a una alteración clínica de origen neuropático (afectación en los nervios) e inducida por la hiperglucemia (azúcar alto), en la que con o sin coexistencia de isquemia (falta de riego sanguíneo), y previo desencadenante traumático, produce lesión y/o ulceración del pie.

El paciente diabético es más susceptible a la infección, ya que la mayoría de diabéticos de larga evolución están inmunológicamente deprimidos. La infección no es la responsable de la aparición de las lesiones, pero si interviene en la evolución de las mismas una vez aparecidas.

2.3.8.2.3. Enfermedad Vascular Cerebral (EVC)

Comprende un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, con la consecuente afectación, de manera transitoria o permanente, de la función de una región generalizada del cerebro o de una zona más focal, sin que exista otra causa aparente que el origen vascular. Puede ser causada por la oclusión de la luz por embolia o trombosis, ruptura de un vaso, una alteración de la permeabilidad de su pared, o aumento de la viscosidad u otro cambio en la calidad de la sangre que fluye a través de los vasos cerebrales.

La enfermedad cerebrovascular trae como consecuencia procesos isquémicos (de falta de sangre) o hemorrágicos (derrames), causando o no la subsecuente aparición de sintomatología o secuelas neurológicas. Por lo tanto, hay dos tipos principales de accidente cerebrovascular.

- Accidente cerebrovascular isquémico: Ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras: Se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha. Esto se

denomina accidente cerebrovascular trombótico. O de lo contrario por un coágulo que se puede desprender de otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro, o de alguna parte en el cuerpo, y trasladarse hasta el cerebro. Esto se denomina embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico.

- Accidente cerebrovascular hemorrágico: Ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe. Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable. Estos defectos pueden incluir: aneurisma y malformación arteriovenosa (MAV).

Los síntomas dependen de qué parte del cerebro esté dañada. Es posible que una persona no se dé cuenta de que ha tenido un accidente cerebrovascular, la mayoría de las veces los síntomas se presentan de manera súbita y sin aviso. Pero, los síntomas pueden ocurrir intermitentemente durante el primero o segundo día. Por lo general son más graves cuando el accidente cerebrovascular acaba de suceder, pero pueden empeorar lentamente.

2.3.9. PREVENCIÓN

(Lupaca, 2013) Describe:

En primer lugar, debemos entender que la prevención según las Naciones Unidas es la adopción de determinadas acciones y procedimientos para prevenir enfermedades o cualquier complicación que se presente durante el proceso de atención de enfermería.

Por otro lado, García P, Mesejo A. Mencionan a las complicaciones de la diabetes tipo 2 como causa importante de los decesos y discapacidades, generando altos costos de salud pública. Las complicaciones que ocurren en esta enfermedad incluyen neuropatía, problemas del sistema ocular, daño renal o insuficiencia renal y el conocido pie diabético.

Por tanto, prevenir las complicaciones de la diabetes tipo 2 se refiere a aquellos procesos o acciones que las personas realizan con el fin de mantener el control de su propia salud, evitando así el desarrollo de complicaciones como el pie diabético o la hipertensión.

La prevención de la diabetes y sus complicaciones implica un conjunto de acciones adoptadas para evitar su aparición o progresión. La prevención es un pilar que debe evitar la aparición de la enfermedad, el desarrollo de las complicaciones agudas y crónicas, para lo cual debe llevarse a cabo a través de un equipo multidisciplinario y estrechamente vinculado que permita, a través de sus acciones, obtener impactos en la salud del paciente con factores de riesgo asociados a diabetes mellitus o quienes ya la padecen. La prevención de la diabetes mellitus se realiza en tres niveles: primaria, secundaria y terciaria.

2.3.9.1. Prevención primaria

Tiene como objetivo evitar el inicio de la enfermedad. En la práctica, prevención es toda actividad que tiene lugar antes de las manifestaciones de la enfermedad con el propósito específico de prevenir su aparición. Existen dos tipos de estrategias de intervención primaria: en la población general y en la población con factores de riesgo asociados a la diabetes. En la población en general; medidas destinadas a modificar el estilo de vida y las características socioambientales, conforme a los factores de

riesgo que, unidas a factores genéticos, constituyen causas desencadenantes de la diabetes.

Las acciones de prevención primaria deben ejecutarse, no sólo a través de actividades médicas, sino también con la participación y compromiso de la comunidad y autoridades sanitarias utilizando los medios de comunicación masivos existentes en cada región como radio, prensa y televisión, entre otros. Los factores protectores para la prevención y control de esta enfermedad consisten en modificar los cambios en el estilo de vida que abarca reducción de peso, una adecuada nutrición, la realización de ejercicio y la disminución de los factores de riesgo cardiovascular.

En la población con factores de riesgo, la intervención inicial y a lo largo del padecimiento se realizará especialmente con tratamiento no farmacológico y consistirá en:

- Educación para la salud: folletos, revistas y boletines, entre otros.
- Promoción de la salud: corrección de factores dentro del estilo de vida.
- Prevención y corrección de obesidad: dietas con bajo contenido graso y azúcares refinados y alta proporción de fibra alimentaria.
- Uso racional y prescripción adecuada de medicamentos diabetogénicos, por ejemplo, diuréticos, corticoides, beta-bloqueadores.
- Promoción del ejercicio físico rutinario y programado.
- Integración a Grupos de Ayuda Mutua, encaminados a que el o la paciente sea responsable de su autocuidado y permanentemente se autogestionen en pro de su control metabólico.
- Uso de la evidencia científica a través de monofármacos preventivos, que disminuyan el porcentaje de conversión a DMT-2, conforme a la Guía de recomendaciones para la promoción de la

salud, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la prediabetes.

2.3.9.2. Prevención Secundaria

Estará encaminada a pacientes ya confirmados con diabetes mellitus y cuyos objetivos son evitar la aparición de complicaciones agudas, y evitar o retrasar las complicaciones crónicas. Las acciones para cumplir los objetivos propuestos se fundamentan en el control metabólico óptimo y permanente de la enfermedad.

2.3.9.2. Prevención Terciaria

Estará dirigida a pacientes que presentan complicaciones crónicas y tiene como objetivo evitar la discapacidad por insuficiencia renal, ceguera, pie diabético y evitar la mortalidad temprana por enfermedad cardiovascular. Estas acciones requieren de la participación de profesionales especializados en las diferentes complicaciones.

2.4. MARCO CONCEPTUAL

- **DIURÉTICO:**Sustancia, medicamento que facilita o aumenta la eliminación de orina.
- **ISQUÉMIA:**Detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias de una determinada zona, que comporta un estado de sufrimiento celular por falta de oxígeno y materias nutritivas en la parte afectada.
- **EMBOLIA:**Obstrucción de una vena o una arteria producida por un émbolo (coágulo sanguíneo, burbuja de aire, gota de grasa, cúmulo de bacterias, células tumorales, etc.) arrastrado por la sangre.
- **MACRÓFAGOS:** Célula de gran tamaño que tiene capacidad de fagocitar partículas grandes y que se encarga de destruir los antígenos (y las células que los transportan) y de presentarlos a los linfocitos encargados de iniciar el proceso inmunológico.
- **APIÑAN:**Juntar o agrupar estrechamente personas o cosas.
- **QUIMIOQUINAS:**Cada una de las proteínas de un grupo numeroso producidas por determinadas células inmunitarias y otras células del cuerpo.
- **ÁLGICA:**Derivado del sufijo latín -algia, y este del griego -αλγία, dolor (Doloroso).
- **MESANGIAL:**Tejido conectivo especial que sirve de sostén del entramado vascular y que ocupa el espacio entre las asas capilares del glomérulo.

- **HIPERFILTRANTE:**Que filtra o sirve de filtro.
- **COMORBILIDAD:**término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro.
- **ANHIDRA:**Que no contiene agua.
- **MG/DL:**Miligramos sobre Decilitros.
- **DM2:**Diabetes Mellitus Tipo 2.
- **ESTEATOSIS:**Enfermedad por hígado graso es una afección en la que se acumula grasa en el hígado.
- **POLIHIDRAMNIOS:**Es una afección que se presenta cuando se acumula demasiado líquido amniótico durante el embarazo. También se conoce como trastorno del líquido amniótico, o hidramanios.
- **ADRENARQUIA:**aparición de vello púbico, vello axilar u olor corporal. Se considera prematura cuando aparece antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 años en niños.
- **MULTIPARIDAD:**Corresponde a aquella condición por la cual la gestante ha tenido 2 o más partos.
- **DISLIPIDEMIA:**es una concentración elevada de lípidos (colesterol, triglicéridos o ambos) o una concentración baja de colesterol rico en lipoproteínas (HDL).

- **HIPOGONADISMO:** es una afección en la cual los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres producen pocas o ninguna hormona sexual.
- **ALELOS:**Cada una de las maneras en que puede manifestarse un carácter o un gen.
- **HISTOCOMPATIBILIDAD:**Semejanza o identidad inmunológica entre los tejidos de un donante y el receptor del injerto o el trasplante.
- **IDIOPÁTICO:**Describe una enfermedad de origen desconocido.
- **POLIFAGIA:**Sensación imperiosa e incontenible de hambre que se presenta en determinadas enfermedades.
- **POLIDIPSIA:**Necesidad exagerada y urgente de beber, que suele ser patológica y acompaña a enfermedades como la diabetes.
- **POLIURIA:** Excreción muy abundante de orina.
- **GLUCOSURIA:**Presencia de glucosa en la orina.
- **PEPTIDASA:**son enzimas que rompen los enlaces peptídicos de las proteínas. Para ello, utilizan una molécula de agua (mediante hidrólisis), por lo que se clasifican como hidrolasas.
- **AMILASA:**Es una enzima que ayuda a digerir los carbohidratos. Se produce en el páncreas y en las glándulas salivales.

- **LIPASA:**es una proteína (enzima) secretada por el páncreas dentro del intestino delgado. Ayuda a que el cuerpo absorba la grasa descomponiéndola en ácidos grasos.
- **ZIMÓGENOS:**Es un precursor enzimático inactivo, es decir, no cataliza ninguna reacción como hacen las enzimas.
- **ENZIMA:**Proteína soluble producida por las células del organismo, que favorece y regula las reacciones químicas en los seres vivos.
- **ADYACENTE:**Que está muy próximo o unido a otra cosa.
- **UNCINADO:**Con forma de gancho.
- **ELONGADA:**Alargar, estirar, hacer algo más largo por tracción mecánica.
- **TRANSPILÓRICO:**es una línea horizontal imaginaria a través de la vértebra L1, una línea que es importante cuando se efectúan estudios de imágenes radiográficos.
- **HIPERGLUCEMIA:**Aumento anormal de la cantidad de glucosa que hay en la sangre.
- **HIPOGLUCEMIA:**Disminución de la cantidad normal de glucosa en la sangre; produce mareos, temblores y cefalea, entre otros síntomas.
- **TERAPÉUTICO:**De la terapéutica o relacionado con esta parte de la medicina.

- **NECROPSIA:**Es un procedimiento ordenado y minucioso, que incluye la revisión tanto el aspecto externo como la revisión de los órganos internos.
- **SISTÉMICO:**Pertenece o relativo a la totalidad de un sistema.
- **CAPILAR:**Que tiene un diámetro interior semejante al grosor de un cabello.
- **NEUROPATIA:** Problema de los nervios que produce dolor, adormecimiento, cosquilleo, hinchazón y debilidad muscular en distintas partes del cuerpo.
- **GASTROPARESIA:**Es un trastorno que retrasa o detiene el movimiento de los alimentos del estómago al intestino delgado.
- **HIPERTROFIA:**Crecimiento excesivo y anormal de un órgano o de una parte de él debido a un aumento del tamaño de sus células.
- **VASCULAR:**Que está formado por vasos (conductos) o los posee.

CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO

(Ponce & Jiménez, 2015) argumentan:

Para diseñar una investigación es importante especificar las características del diseño metodológico (tradicionalmente se conoce como la sección de material y métodos o metodología de un proyecto de investigación). El diseño metodológico le dará identidad propia, única y muy particular a la investigación que se desea realizar y ayudará al lector a comprender adecuadamente en qué consistirá la investigación.

El diseño metodológico es la descripción detallada y precisa de las estrategias y procedimientos de cómo se va a realizar la investigación. Los elementos que deben incluirse en el diseño metodológico deben estar relacionados de forma lógica, congruente, presentados y ordenados de manera coherente y sencilla.

(Peña, 2009) señala:

El Diseño metodológico, es una relación clara y concisa de cada una de las etapas de la intervención. El diseño metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la propuesta de intervención.

El diseño metodológico son los pasos a seguir para generar una información que mi proyecto de investigación requiere, a la luz de una temática y unos objetivos que se problematizan.

Un diseño metodológico es la forma particular de cómo cada interventor/a organiza su propuesta de intervención. Lo metodológico debe estar soportado por la postura epistemológica, conceptual y ontológica del interventor/a; es decir, cada diseño metodológico ha de responder con

coherencia interna a la concepción de ser humano, a la concepción de educación y a los principios pedagógicos que orientan a cada interventor/a en su quehacer. Por lo tanto, la estrategia de intervención depende del tipo de estudio que se elija (el enfoque), ya que éste determina el diseño, el proceso propuesto a la comunidad, la información generada, la forma como se trabajará con la comunidad y el lugar del profesional interventor.

3.1 FORMAS O TIPOS DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación realizada sobre la “Prevención de Complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo II en pacientes de 50 a 60 años en el Barrio Santa Cruz, Frontera Comalapa Chiapas”, es aplicada debido a que la investigación se llevará a la práctica mediante medidas de prevención con nuestra muestra que son las personas del lugar antes mencionado por medio de los instrumentos más factibles y de esta forma poder comprobar hipótesis planteada al inicio.

3.1.1 INVESTIGACION PURA

(Tamayo, 1999) Menciona:

Recibe también el nombre de pura y fundamental, tiene como fin la búsqueda del progreso científico, mediante el acrecentamiento de los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es de orden formal y busca las generalizaciones con vista al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes.

3.1.2 INVESTIGACIÓN APLICADA

(Bunge, 1969) Afirma:

La investigación aplicada busca o perfecciona recursos de aplicación del conocimiento ya obtenido mediante la investigación pura, y, por tanto, no busca la verdad, como la investigación pura, sino la utilidad. En otras palabras, se trata aquí de investigar las maneras en que el saber científico producido por la investigación pura puede implementarse o aplicarse en la realidad para obtener un resultado práctico.

3.2 TIPOS DE ESTUDIO

(Cazau, 2006) señala:

La investigación es un proceso por el cual se enfrentan y se resuelven problemas en forma planificada, y con una determinada finalidad.

El tema de investigación “Prevención de Complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo II en pacientes de 50 a 60 años en el Barrio Santa Cruz, Frontera Comalapa Chiapas” es un estudio de tipo explicativa y descriptiva. Es explicativa porque como personal de Enfermería y del área de Salud se expondrá y se explicara las medidas preventivas de la patología en estudio, así como los factores desencadenantes. Por otro lado, también es un estudio de tipo descriptivo porque se describirá y se dará a conocer el proceso fisiopatológico de la Diabetes Mellitus tipo II, los factores de riesgo, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, prevención y principalmente las complicaciones de dicha enfermedad.

3.2.1 ESTUDIO CORRELACIONAL

Cortés e Iglesias (2004) Mencionan:

Los estudios correlacionales tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables. La utilidad principal de los estudios correlacionales cuantitativos es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas.

3.2.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO

Cortés e Iglesias (2004) Señalan:

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Describen situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se efectúan mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice.

3.2.3 ESTUDIO EXPLICATIVO

Sampieri, Fernández y Baptista (2006) Reafirman:

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables.

3.2.4 ESTUDIO EXPLORATORIO

Sampieri, Fernández y Baptista (2006) Explican:

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas.

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El presente tema “Prevención de Complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo II en pacientes de 50 a 60 años en el Barrio Santa Cruz, Frontera Comalapa Chiapas” es una investigación de tipo no experimental, y sobre todo específicamente de corte transversal, debido a que solo se estudiará el fenómeno o la patología una sola ocasión sin modificar conductas, exceptuando las medidas de prevención que en la mayoría de los casos, las personas no practican y sobre todo porque solo se observará la situación actual tal y como está sucediendo en su contexto natural.

3.3.1 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

Malagar, (2008) Considera:

En este método los tratamientos de la variable independiente han sido manipulados por el investigador-X- por lo que se tiene el mayor control y evidencia de la causa y efecto.

Sampieri (2006) Señala:

En los experimentos se diseñan pruebas en las cuales se inducen cambios es decir se manipulan las variables que intervienen en un proceso o sistema deliberadamente (supuestas causas), de manera que sea posible observar, identificar y analizar las causas en la respuesta obtenida. En un experimento, el investigador construye deliberadamente una situación a la que son expuestos varios individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, condición o estímulo bajo determinadas circunstancias, para después analizar los efectos de la exposición o aplicación de dicho tratamiento o condición. Por decirlo de alguna manera, en un experimento se ‘construye’ una realidad.

3.3.2 INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL

Malagar, (2008) Refiere:

En este método, existe un grupo de sujetos a los cuales se realiza una prueba-O- de medición de la variable dependiente, pero los tratamientos de la variable independiente-X- no fueron manipulados o controlados por el investigador. También se denomina investigación ex - post - facto.

Sampieri (2006) Indica:

La investigación no experimental es la que no manipula deliberadamente las variables a estudiar. Lo que hace este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto actual, para después analizarlo. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes.

3.3.2.1 INVESTIGACIÓN TRANSVERSAL

(Sampieri, 2010), Menciona:

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede.

3.3.2.2 INVESTIGACIÓN LONGITUDINAL

(Sampieri, 2010), Señala:

Son estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución, sus causas y sus efectos.

3.4 ENFOQUES

Toda investigación necesita contar con enfoques que orienten su realización, que permitan diseñar y/o elegir los instrumentos que nos servirán para la recolección de los datos y las características que éstos deben tener.

La investigación que se viene mencionando hasta este momento tiene un enfoque mixto debido a que combinamos el enfoque cuantitativo con el cualitativo; es decir que se describirán cualidades o características del fenómeno (patología) y posteriormente se usaran datos numéricos.

3.4.1 ENFOQUE CUALITATIVO

(Patton 1980,1990), Menciona:

Los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Por lo expresado en los párrafos anteriores, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades.

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.

3.4.2 ENFOQUE CUANTITATIVO

(Sampieri 2006), Menciona:

Cuando hablamos de una investigación cuantitativa damos por aludido al ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamenta dicho enfoque, en analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema planteado. Este enfoque utiliza la recolección de datos para comprobar hipótesis, que es importante señalar, se han planteado con antelación al proceso metodológico; con un enfoque cuantitativo se plantea un problema y preguntas concretas de lo cual se derivan las hipótesis.

3.4.3 ENFOQUE MIXTO

(Sampieri) Menciona:

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.

(Cortés e Iglesias, 2004), Afirman:

La investigación es mixta porque se utilizará tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo, en el cualitativo se observará las reacciones de la gente a la hora de responder la encuesta; es cuantitativo porque realizaremos encuestas para cuantificar el problema.

En un enfoque mixto el investigador utiliza las técnicas de cada uno por separado, se hacen observaciones, entrevistas, se realizan encuestas para saber las opiniones de cada cual sobre el tema en cuestión, se trazan lineamientos sobre las políticas a seguir según las personas que intervengan, además esas encuestas pueden ser valoradas en escalas medibles y se hacen valoraciones numéricas de las mismas, se obtienen rangos de valores de las respuestas, se observan las tendencias obtenidas, las frecuencias, se hacen histogramas, se formulan hipótesis que se corroboran posteriormente.

3.5 UNIVERSO O POBLACIÓN

La población de estudio será el Barrio Santa Cruz, Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas.

Como profesionales de la salud surge el interés de abordar este tema ya que es un problema que va en aumento en nuestros días y específicamente en este Municipio la incidencia es mucho más alta debido a la falta de conocimientos sobre las Complicaciones para disminuir el porcentaje de esta enfermedad y por ende evitar defunciones a causa de la Diabetes Mellitus.

(Leon, 2007) Menciona:

La población de una investigación está compuesta por todos los elementos (personas, objetos, organismos, historias clínicas) que participan del fenómeno que fue definido y delimitado en el análisis del problema de investigación. La población tiene la característica de ser estudiada medida y cuantificada.

(Selltiz, 1980), Recalca:

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.

3.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL

Frontera, es un adjetivo refiriéndose al límite que hace con la República de Guatemala y el término Comalapa proviene de la voz náhuatl: Comalapan, “en el agua de los comales”, que deriva de las voces: Comalli, comal; Atl, agua; y Pan, adverbio de lugar. Pero también se considera que su nombre

se debe al recuerdo de la extinta San Juan Comalapa, y está sobre el paraje Cushú, que se encontraba cerca de Tecpan, Guatemala; es decir en la frontera. El Municipio de Frontera Comalapa es uno de los 122 municipios que conforman el estado mexicano de Chiapas. Se encuentra ubicado en la zona fronteriza del estado. Su cabecera, la localidad de Frontera Comalapa, recientemente fue catalogada como "ciudad". Se localiza en los límites de la Sierra Madre de Chiapas y la depresión central.

Frontera Comalapa se encuentra ubicado en la zona fronteriza del Estado de Chiapas, limita al norte con el municipio de La Trinitaria, al oeste con el municipio de Chicomuselo, al sur con los municipios de Amatenango de la Frontera y Bella Vista, al este limita con Guatemala, en particular con el Departamento de Huehuetenango. Tiene una extensión territorial del 717.90 km² que representan el 5.62% de la superficie de la región Fronteriza y el 0.94% a nivel estatal.

Se encuentra ubicado en la transición entre la Sierra Madre de Chiapas y la Depresión Central de Chiapas, por lo que su relieve es diverso, siendo montañoso al sur y desciende en medida que se avanza hacia el norte. El municipio tiene una población de 57,580 habitantes según los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de ese total, 27,349 son hombres y 30,231 son mujeres.

El Barrio Santa Cruz es una localidad del municipio Frontera Comalapa, en Chiapas, y abarca un área cercana a 11 hectáreas. En Barrio Santa Cruz viven unas 1,050 personas en 271 unidades habitacionales. Se registran 890 personas por km², con una edad promedio de 25 años y una escolaridad promedio de 8 años cursados.

3.6 MUESTRA

(M. I. Ortego), Afirma:

Se denomina muestra a un subconjunto de unidades estadísticas extraído del universo del cual se quiere conocer ciertas características. Es a partir de los resultados observados sobre la muestra que se va a extrapolar para producir estimaciones de dicho universo.

La muestra de nuestra investigación serán quince personas del Barrio Santa Cruz, Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas”.

3.6.1 TIPOS DE MUESTREO

La investigación que se presenta es no probabilística de tipo de muestreo accidental o bola de nieve, es no probabilística debido a que solo se encuestarán a un número determinado de personas de la población general del Barrio y es accidental o bola de nieve ya que se encuestarán a personas de la población general que se encuentren disponibles en ese momento en el lugar acordado. A continuación, se describen los diferentes tipos de muestreo.

3.6.1.1 PROBABILÍSTICO

Es requisito que todos y cada uno de los elementos de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionados (azar). Se debe tener disponible un listado completo de todos los elementos de la población, a esto se le llama Marco de Muestreo.

3.6.1.1.1 Aleatorio Simple

(Velázquez A. P.) Señala:

El muestreo aleatorio es una técnica que permite obtener una muestra representativa de la población. Ésta se basa en el concepto de probabilidad, el cual marca que cualquier elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido y que la elección de cada elemento es independiente de cualquier selección previa. Los muestreos probabilísticos son de varios tipos.

3.6.1.1.2 Estratificado

(Otzen T. 2017) Define:

Aleatorio estratificado: Se determina los estratos que conforman la población blanco para seleccionar y extraer de ellos la muestra (se define como estrato a los subgrupos de unidades de análisis que difieren en las características que van a ser analizadas).

3.6.1.1.3 Sistemático

(Velázquez M. e.), Menciona:

En este caso se elige de manera aleatoria el sitio de muestreo para un estrato determinado, mientras que en los estratos restantes el sitio de muestreo se determina a partir de la misma posición relativa. Un caso típico de esto consiste en elegir el centro de cada estrato como sitio de la muestra.

3.6.1.1.4 Por Conglomerado

(Otzen T. 2017) Menciona:

Consiste en elegir de forma aleatoria ciertos barrios o conglomerados dentro de una región, ciudad, comunidad etc., para luego elegir unidades más pequeñas como cuadras, calles, etc. y finalmente otras más pequeñas, como escuelas, consultorios, hogares (una vez elegido esta unidad, se aplica el instrumento de medición a todos sus integrantes).

3.6.1.2 NO PROBABILÍSTICO

(Sampieri, 2010), Argumenta:

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación.

3.6.1.2.1 Muestreo por Conveniencia

(Casal, 2003) Explica:

Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo de muestreos la “representatividad” la determina el investigador de modo

subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método ya que no podemos cuantificar la representatividad de la muestra.

3.6.1.2.2 Muestreo por Cuotas

Todos los elementos conocidos de la población tienen que aparecer en la muestra. Se debe asegurar que estos aparezcan en la misma proporción que en la población. El investigador entrevista a todas las personas de cada categoría que pueda encontrar hasta que haya llenado la cuota.

3.6.1.2.3 Accidental o Bola de Nieve

Espinoza señala:

Se aprovecha o utiliza personas disponibles en un momento dado que se corresponda con el propósito del estudio.

3.7 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Las técnicas que principalmente se aplicarán en esta investigación son, la observación y la encuesta, ésta última a partir de la aplicación de un cuestionario compuesta de preguntas abiertas y cerradas con la finalidad de obtener opiniones o respuestas más precisas y hacer mucho más fácil la tabulación de los resultados.

Las técnicas que se usaron en la investigación son la observación directa en la que observaremos las actitudes de las personas a la hora de encuestarlas, así como la técnica de la encuesta para recopilar datos indispensables para comprobar hipótesis.

3.7.1 OBSERVACIÓN

Tradicionalmente el acto de "observar" se asocia con el proceso de mirar con cierta atención una cosa, actividad o fenómeno, o sea concentrar toda su capacidad sensitiva en algo por lo cual estamos particularmente interesados.

En la investigación se hará uso de esta técnica, apoyándose del instrumento ficha de observación.

3.7.2 ENCUESTA

Para algunos investigadores no es otra cosa que la recolección sistemática de datos en una población o en una muestra de la población, mediante el uso de entrevistas personales y otros instrumentos para obtener datos. Habitualmente a este tipo de estudio se le denomina así, cuando se ocupa de grupos de personas, numerosas y dispersas. Para otros, la encuesta es solo una pluralidad de técnicas que se utilizan a nivel masivo.

En la investigación se utilizará la encuesta para recopilar datos de la muestra apoyándose del instrumento cuestionario, el cual consta de tres apartados con un total de 15 preguntas, dicho cuestionario se aplicará a quince personas que se encuentren disponibles en el Barrio Santa Cruz, Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas.

3.8 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.8.1 CUESTIONARIO

A continuación, se presenta el modelo de cuestionario que se aplicará a nuestra muestra, el cual se llevará a cabo en el Barrio Santa Cruz, Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas a 15 personas que se encuentren disponibles en ese momento. La encuesta se llevará a cabo el día 20 de mayo del año 2022 a las 11:00 hrs.

CUESTIONARIO

Fecha: _____ **N° De Cuestionario:**_____.

A continuación se presenta un cuestionario elaborado para fines de investigación, por lo que te pedimos de la manera más respetuosa y sincera responder cada una de ellas o en su caso apoyarnos con los datos solicitados.

Nota: Es importante aclarar que los datos y las respuestas obtenidas serán tratadas con respeto y sobre todo con confidencialidad.

Instrucciones: Lee detenidamente cada una de las preguntas que se te presentan o datos que se te solicitan y posteriormente marca con una línea la respuesta que tu consideres.

I.- DATOS PERSONALES

Nombre: _____

Edad: _____ **Sexo:** _____

Escolaridad:_____ **Ocupación:**_____

II. DATOS DE CONOCIMIENTO

1.- ¿CONOCE EL CONCEPTO DE DIABETES MELLITUS?

- a) Si
- b) No

2.- SABE COMO SE CLASIFICA LA DIABETES MELLITUS?

- a) Si
- b) No

3.- ¿CONOCE ALGUNA MEDIDA PARA PREVENIR COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS?

- a) Si
- b) No

4.- ¿SABE CUALES SON LAS COMPLICACIONES MAS FRECUENTES EN UN PACIENTE CON DIABETES MELLITUS?

- a) Si
- b) No

III. DATOS DE LA PATOLOGIA

5.- ¿CUANTOS AÑOS LLEVA PADECIENDO LA DIABETES MELLITUS?

- a) Menos de un año
- b) De 1 a 5 años
- c) De 6 a 10 años
- d) Más de 10 años

6.- ¿LLEVA UN CONTROL ADECUADO DE SU ENFERMEDAD?

- a)
- b) Si
- c) No

7.- ¿CON QUE FRECUENCIA MONITORIZA SU NIVEL DE GLUCOSA?

- a) Diario
- b) Cada semana
- c) Cada 15 días
- d) Cada mes

8.- ¿CONSUME ALGUN MEDICAMENTO PARA CONTROLAR LA DIABETES MELLITUS?

- a) Si
- b) No

9.- ¿QUE MEDICAMENTO CONSUME PARA EL CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS?

10.- ¿LLEVA EL CONTROL DE SU PESO Y TALLA?

- a) Si
- b) No

11.- ¿UTILIZA ALGUN PRODUCTO PARA EL CUIDADO DE SUS PIES?

- a) Si
- b) No

12.- ¿CON QUE FRECUENCIA ACUDE AL MEDICO PARA SU CONTROL?

- a) Cada mes

- b) Cada dos meses
- c) Cada seis meses
- d) Cada año

13.- ¿TIENE O HA TENIDO ALGUNA COMPLICACION A CAUSA DE LA DIABETES MELLITUS?

- a) Si
- b) No

14.- ¿ALGUNA VEZ HA RECIBIDO INFORMACION SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAS COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS?

- a) Si
- b) No

15.- ¿REALIZAS ALGUN TIPO DE EJERCICIO O ACTIVIDAD FÍSICA?

- a) Si
- b) No

CAPITULO VI: RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL MARCO METODOLOGICO

El día viernes 20 de Mayo del año en curso se realizó la aplicación de las encuestas y fichas de observaciones a las personas previstas de acuerdo a la muestra establecida. Consiste en quince personas que se encontraron en el Barrio Santa Cruz, Municipio de frontera Comalapa, Chiapas.

La encuesta se llevó a cabo en un promedio de 4 horas por parte de los tesisistas profesionales de Enfermería del 9° cuatrimestre, modalidad semiescolarizada de la Universidad del Sureste, Campus de la Frontera.

Cabe destacar que el proceso de investigación se llevó a cabo de manera satisfactoria obteniendo los resultados de la participación deseada.

En el siguiente apartado se presenta los resultados a través de graficas que nos permitieron realizar un análisis e interpretación de la información para conocer la situación que prevalece respecto al fenómeno Prevención de complicaciones de la Diabetes Mellitus tipo II en pacientes de 50 a 60 años, en el Barrio Santa Cruz, Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, que a su vez fue la base para la construcción de las recomendaciones y propuestas que se presentaran más adelante.


4.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

TABLA 1: DATOS PERSONALES

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
EDAD	50-55	7	47%
	56-60	8	53%
	TOTAL	15	100%
SEXO	FEMENINO	7	47%
	MASCULINO	8	53%

	TOTAL	15	100%
ESCOLARIDAD	PRIMARIA	7	47%
	SECUNDARIA	3	20%
	PREPARATORIA	0	
	UNIVERSIDAD	5	33%
	TOTAL	15	100%
OCUPACION	AMA DE CASA	6	40%
	COMERCIANTE	7	47%
	CARPINTERO	2	13%
	TOTAL	15	100%


GRÁFICA 1



ANÁLISIS: La gráfica anterior presenta la variable de edad y observamos que el mayor número de porcentaje, es decir el 53% corresponde a personas de entre 56 a 60 años y el otro 47% a personas de 50 a 55 años de edad.

INTERPRETACIÓN: En la gráfica presentada podemos observar la diferencia tan notable entre los grupos de edad, ya que la mayoría corresponde a edades avanzadas y la menor parte a personas en edades promedio y de esta forma podemos interpretar claramente que las personas mayores tienen un alto riesgo de alguna complicación por Diabetes Mellitus.


GRÁFICA 2



ANÁLISIS: De acuerdo a la gráfica presentada se observa que el 53% de los encuestados pertenecen al sexo masculino y el resto al sexo femenino.

INTERPRETACIÓN: La grafica nos demuestra que la mayor parte de las encuestadas son hombres y la minoría corresponde a mujeres, lo que nos relaciona la incidencia de la enfermedad con el sexo ya que estudios hechos argumentan que son los hombres que tienden a padecer complicaciones por la diabetes por el mal control.

GRÁFICA 4




ANÁLISIS: En la tabulación de la variable ocupación se observa que el mayor porcentaje con un 47% se trata de personas que se dedican al comercio, un 40% son amas de casa y finalmente el 13% se dedican a la carpintería.

INTERPRETACIÓN: La grafica anterior nos presenta la distribución de la ocupación de los encuestados y podemos observar que la mayoría de personas de nuestra muestra se dedica al comercio y la menor parte a la carpintería, lo que nos da la pauta para pensar que al estar trabajando en el comercio su alimentación no es la adecuada comparado con las amas de casa, aumentando así el riesgo de padecer Diabetes Mellitus.

TABLA 2. DATOS DE CONOCIMIENTO

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CONCEPTO DE DIABETES MELLITUS	SI	6	40%
	NO	9	60%
	TOTAL	15	100%
CLASIFICACION DE DIABETES MELLITUS	SI	3	20%
	NO	12	80%
	TOTAL	15	100%
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA DM	SI	3	20%
	NO	12	80%
	TOTAL	15	100%
COMPLICACIONES DE LA DIAETES MELLITUS	SI	13	87%
	NO	2	13%
	TOTAL	15	100%

GRÁFICA 5




ANÁLISIS: La grafica anterior muestra que, de la población encuestada para el trabajo de investigación, el 60% no conoce el concepto de diabetes mellitus y solo el 40% si conoce el concepto de esta patología.

INTERPRETACIÓN: En esta grafica podemos darnos cuenta que la mayoría de las personas encuestadas no conoce el concepto de diabetes mellitus, si han escuchado este término, pero en realidad no conocen el concepto y solo menos de la mitad si conoce el concepto, lo que nos

indica que para nuestra investigación fue de suma importancia la promoción de este tema para ayudar a disminuir el riesgo de padecerla.

GRÁFICA 6




ANÁLISIS: La variable de conocimiento sobre la clasificación de la diabetes es la que se muestra en la gráfica de arriba y se observa que un 80% de la población estudiada no la conoce, mientras que el 20% si tiene conocimiento sobre la clasificación.

INTERPRETACIÓN: La grafica anterior nos ayuda a determinar que de toda la muestra estudiada, la gran mayoría no conoce la clasificación de la diabetes mellitus, por lo tanto esto nos lleva a pensar que al igual que la

variable de concepto de diabetes esta relacionada con esta grafica ya que si no conocen el concepto, por lógica también desconocen su clasificación y esto puede llevar a que la población pueda adquirir la enfermedad por falta de conocimientos.


GRÁFICA 7



ANÁLISIS: La variable de conocimiento de la prevención de diabetes mellitus nos enseña en la gráfica que el 80% desconoce cómo prevenirla mientras que el 20% si conoce algunas medidas preventivas.

INTERPRETACIÓN: En la gráfica anterior observamos la gran diferencia entre las personas que no conocen medidas preventivas de la diabetes y las que si conocen algunas medidas. Esto nos lleva a la conclusión de que cuanto mayor conocimiento se tenga sobre las medidas preventivas de la diabetes mellitus menor será el número de incidencia de esta enfermedad.

GRÁFICA 8



ANÁLISIS: La variable de conocimiento de las complicaciones de la diabetes mellitus nos enseña en la gráfica que el 47% desconoce cuáles son estas complicaciones, mientras que el otro 53% si conoce algunas medidas preventivas.


INTERPRETACIÓN: En la gráfica anterior observamos la gran diferencia entre las personas que no conocen las complicaciones que pueden aparecer por el padecimiento de la diabetes mellitus y las que si conocen. Esto nos lleva a la conclusión de que cuanto mayor conocimiento se tenga

sobre las complicaciones de la diabetes mellitus se podrá reducir en gran cantidad la aparición de estos problemas.

TABLA 3: DATOS DE LA PATOLOGIA

VARIABLE	DETALLE	FRECUENCIA	PORCENTAJE
AÑOS DE PADECIMIENTO	MENOS DE UN AÑO	6	40%
	DE 1 A 5 AÑOS	6	40%
	DE 6 A 10 AÑOS	2	13%
	MAS DE 10 AÑOS	1	7%
	TOTAL	15	100%
CONTROL DE LA DIABETES	SI	9	60%
	NO	6	40%
	TOTAL	15	100%
FRECUENCIA DE MONITORIZACION DE LA GLUCOSA	DIARIO	0	0%
	CADA SEMANA	0	0%
	CADA 15 DIAS	4	27%
	CADA MES	11	73%
	TOTAL	15	100%
FÁRMACO PARA LA DIABETES	SI	11	73%
	NO	4	27%
	TOTAL	15	100%
FARMACO PARA LA DIABETES	GLIBENCLAMIDA	10	67%
	METFORMINA	3	20%
	NO CONSUME	2	13%
	TOTAL	15	100%
CONTROL DE PESO Y TALLA	SI	10	67%
	NO	5	33%
	TOTAL	15	100%
PRODUCTO PARA CUIDADO DE LOS PIES	SI	5	33%
	NO	10	67%
	TOTAL	15	100%
VISITA AL MEDICO	CADA MES	9	60%
	CADA DOS MESES	4	27%
	CADA SEIS MESES	0	0%
	CADA AÑO	2	13%
	TOTAL	15	100%
COMPLICACION POR DIABETES MELLITUS	SI	6	40%
	NO	9	60%
	TOTAL	15	100%
INFORMACION SOBRE PREVENCION DE DIABETES	SI	11	73%
	NO	4	27%
	TOTAL	15	100%
ACTIVIDAD FISICA	SI	12	80%
	NO	3	20%
	TOTAL	15	100%


GRÁFICA 9



ANÁLISIS: En la grafica de arriba se observa la variable de años de padecimiento de la diabetes con un 40% las que llevan menos de un año con la enfermedad al igual que con las que llevan de 1 a 5 años, con un 13% aquellas personas que llevan de 6 a 10 años y finalmente con un 7% las que llevan mas de 10 años con diabetes mellitus tipo II.

INTERPRETACIÓN: En la gráfica anterior observamos que la mayor parte de las personas llevan entre uno y 5 años con la diabetes mellitus y en menor cantidad aquellas entre los 6 y los 10 años, lo que nos hace pensar que el riesgo de padecer una complicación es baja.

GRÁFICA 10




ANÁLISIS: En esta gráfica se puede observar los datos arrojados por la encuesta y nos damos cuenta que el 60% si lleva un buen control de su glucosa en sangre, mientras que un 40% no lleva ese control adecuado.

INTERPRETACIÓN: En la grafica anterior se observa la diferencia entre las personas que si llevan un control adecuado de su enfermedad y las que no. La mayoría se supone que lleva el control adecuado mediante la

monitorización de glicemia capilar y una dieta adecuada y la menor parte no lo lleva de forma adecuada.

GRÁFICA 11




ANÁLISIS: La imagen de arriba nos muestra que de las personas encuestadas solo un 27% se monitoriza la glucosa en sangre por lo menos una vez cada 15 días y en su mayoría con un 73% se checa hasta cada mes.

INTERPRETACIÓN: La variable del control y monitorización de glucemia refleja que la mayoría de las personas encuestadas se checa el nivel de glucosa hasta cada mes y solo una pequeña parte lo hace cada 15 días, pero nadie lo realiza de manera semanal lo que puede interferir en el

control de la enfermedad y si no se controla el riesgo de complicaciones aumenta.

GRÁFICA 12




ANÁLISIS: En la tabulación de esta interrogante se muestra que el 73% si consume algún medicamento para el control de la Diabetes Mellitus, pero existe una pequeña parte con un 27% que no consume ningún fármaco.

INTERPRETACIÓN: Con la tabulación de esta variable nos damos cuenta que la mayor parte de las personas tienen un tratamiento farmacológico para su enfermedad, lo que hace que el riesgo de complicación disminuya,

pero hay que trabajar en el pequeño porcentaje que no consume ningún medicamento.

GRÁFICA 13




ANÁLISIS: En la gráfica presentada se muestran los resultados de la variable fármacos que consume para la diabetes y el 67% de la población toma glibenclámid, el 20% metformina únicamente y un 13% no consume ningún tipo de fármacos para su control.

INTERPRETACIÓN: La variable antes mencionada muestra como la mayoría de las personas encuestadas toma glibenclámid para mantener

controlada su glucosa en sangre, una pequeña parte toma metformina, pero lo que llama la atención es que aun existen personas que no consumen ningún fármaco para su control, lo que puede ser un factor para la aparición de complicaciones.

GRÁFICA 14



ANÁLISIS: En la gráfica presentada se muestran los resultados de la variable peso y talla y el 67% de la población si lleva un buen control de peso y talla y el 33% no lleva el control de esta variable.

INTERPRETACIÓN: El peso y la talla en nuestro tema de investigación son factores muy importantes y tal como se observa en la imagen anterior, la mayoría de las personas si tiene un buen control de su peso y de su

talla, pero otro porcentaje considerable no. Esto nos hace pensar que los pacientes sin control tienen más riesgo de padecer complicaciones.

GRÁFICA 15




ANÁLISIS: En la presente grafica se arrojan los resultados sobre el uso de productos para el cuidado de los pies y se puede observar que el 67% no usa ningún producto mientras que el 33% si usa algún tipo de producto para el cuidado de sus pies.

INTERPRETACIÓN: Los resultados presentados en esta grafica nos enseña que la mayoría de las personas encuestadas no usa ningún producto para el cuidado de los pies, lo que hace evidente que en algún

momento puede aparecer una de las complicaciones mas frecuentes que es el pie diabético.

GRÁFICA 16




ANÁLISIS: La grafica presentada en esta sección muestra la frecuencia de la visita al médico, donde vemos que el 60% realiza su visita cada mes, el 27% cada dos meses y un 13% acude cada año.

INTERPRETACIÓN:La frecuencia de visitas al médico también es un factor preponderante en este trabajo de investigación y observamos que la

mayoría por lo menos acude al medico cada mes, seguido de un pequeño grupo que acude cada dos meses y finalmente un 13% cada año, lo que se expresa en que casi todos al ir al medico se reduce el riesgo de complicaciones.


GRÁFICA 17



ANÁLISIS: En la gráfica presentada se muestran los resultados de la variable peso y talla y el 67% de la población si lleva un buen control de peso y talla y el 33% no lleva el control de esta variable.

INTERPRETACIÓN: El peso y la talla en nuestro tema de investigación son factores muy importantes y tal como se observa en la imagen anterior, la mayoría de las personas si tiene un buen control de su peso y de su talla, pero otro porcentaje considerable no. Esto nos hace pensar que los pacientes sin control tienen más riesgo de padecer complicaciones.


GRÁFICA 18



ANÁLISIS: En esta grafica se observa la variable de conocimiento sobre la prevención de la Diabetes Mellitus, y con un 73% las personas no conocen estas medidas y el 27% si conoce algunas medidas.

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la imagen y con un análisis podemos concluir que la mayor parte de la población investigada no conoce las medidas preventivas de la enfermedad y por ende el riesgo de padecerla aumenta y no solo para el líder del hogar si no el resto de la familia, ya que estas medidas preventivas deberían ser de forma familiar.

GRÁFICA 19



ANÁLISIS: La grafica presentada en esta sección se refiere a la realización de la actividad física y el 80% de las personas encuestadas si realiza alguna actividad y únicamente el 20% no realizan actividades físicas.

INTERPRETACIÓN: En esta grafica se puede observar que la mayor parte de la población si realiza ningún tipo de actividad física, lo que nos lleva a pensar que puede en algún momento disminuir el riesgo de padecer complicaciones.

SUGERENCIAS Y/O PROPUESTAS

De acuerdo al tema de investigación realizado, se pueden establecer algunas medidas de control para la Diabetes Mellitus tipo II y medidas preventivas para la aparición de complicaciones. Para esto se plantean algunas sugerencias y propuestas.

Sugerencias:

- A los programas de salud, se debe integrar un manejo psicosocial de los pacientes diabéticos para prevenir el deterioro de la calidad de vida.
- A los trabajadores de la salud, mantener un interés constante en la afectación de la diabetes mellitus sobre los pacientes tanto física como psicológicamente.
- A los estudiantes de Ciencias Médicas, ampliar el conocimiento sobre calidad de vida en los pacientes con diabetes mellitus tipo II.
- A las escuelas de Ciencias Médicas, apoyar la aplicación de instrumentos de medición de la calidad de vida en diferentes enfermedades.

- A la población diabética, informarse y cumplir con las medidas de tratamiento con el fin de prevenir las complicaciones.

Propuestas:

- Ratificar que realmente el paciente realiza las medidas preventivas para evitar complicaciones mediante talleres supervisados por personal capacitado de forma mensual.
- Formar grupos y realizar visitas a pacientes hospitalizados por complicaciones para concientizar a los pacientes que aún no las padecen y llevarlos a la reflexión mediante estrategias demostrativas.
- Invitar a pacientes con complicaciones a testificar sobre las mismas en grupos de paciente con DM2 sin complicaciones.
- Capacitar y evaluar a pacientes y personal médico en cuanto a conocimientos sobre DM2 con el objetivo de confirmar si la información proporcionada es adecuada apegándose a una planeación estratégica.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, la importancia de las complicaciones macro y microvasculares de la diabetes se pueden manifestar de diferente forma: la retinopatía diabética es la principal causa de la ceguera en adultos diabéticos y sin embargo la evidencia de esto no es manifiesta hasta que no hay reversión; la nefropatía diabética es el motivo fundamental de enfermedad renal terminal, la cual conducirá a la diálisis o al trasplante renal, antes de llegar a esta etapa se deben realizar los análisis y pruebas pertinentes para controlar la evolución del paciente; el mayor porcentaje de amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores se produce en personas diabéticas por lo que hay que controlar las complicaciones que pueden surgir debido a heridas o úlceras y también las debidas al mal transporte de oxígeno y nutrientes en sangre y al retorno de ésta; a su vez la diabetes incrementa de dos a cuatro veces la muerte por enfermedad cardiovascular debido a los problemas asociados a la formación de placas de ateroma y disminución del calibre de los vasos sanguíneos por lo que hay que tener especial cuidado en pacientes con hipertensión, patología cardiovascular o algún episodio isquémico anterior.

Por todas las complicaciones mencionadas, la diabetes representa un problema sanitario y socioeconómico de gran importancia a nivel mundial, afectando recientemente a población cada vez más joven. Los profesionales de la salud deben trabajar unidos para conseguir un diagnóstico precoz, prevenir riesgos y disminuir las complicaciones que conlleva esta enfermedad.

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad con elevada morbimortalidad. Sin embargo, su diagnóstico temprano y la prevención de

los factores de riesgo asociados (hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, tabaquismo), retrasan la aparición de las complicaciones crónicas y todos los riesgos que conllevan, promoviendo una calidad de vida más saludable de los pacientes diabéticos. El control de la glucemia preprandial y postprandial de la población, así como el hábito del ejercicio diario puede disminuir notablemente la preocupación del paciente, por lo que se debe concienciar al ciudadano de todas las ventajas que trae consigo una vida saludable.

Finalmente, como conclusión se observa que, si existe relación significativa entre el cuidado de enfermería y prevención de complicaciones en pacientes diabéticos tipo 2 en personas de 50 a 60 años de edad del Barrio Santa Cruz, Municipio de Frontera Comalapa. Además, que la enfermería tiene un papel clave a la hora de evitar las complicaciones, ya que otorga educación y pautas de autocuidado.

También previene el avance de complicaciones. Hay evidencia científica de que mediante los cuidados de enfermería se mantiene o mejora la calidad de vida del paciente. Lo que refuerza la idea anterior de como el cuidado de la enfermera se relaciona con la prevención de complicaciones en la diabetes, fundamentando que se debe mejorar todas las capacidades de la enfermera para que se desarrolle mejores métodos de como instruir al paciente para que efectúe un autocuidado adecuado que evite complicaciones en su enfermedad.

BIBLIOGRAFÍAS

1. American Diabetes Association. (2004). Diabetic retinopathy. *Diabetes Care* 27 (Suppl. L), S84-S87. Aiello L.P., Gardnet T.W., King G.L. (1998). Diabetic retinopathy (Technical Reviw) *diabetes Care* 21, 143-156.
2. Antonio Dubravcic. Enfermedades del riñón. Noviembre-2008.
3. Arroyo A. Efecto de un programamédicohospitalarioen la cultura de seguridad del pacienteen la unidad de cuidadosintensivos. Perú.
4. Bendezu, B. (2016). *Autocuidado en la prevención de complicaciones diabetes mellitus en usuarios adultos de la estrategia sanitaria* . Perú: Panamericana.
5. Bloomgarden, Z. (2009). Recommendation, debates, and questions. *Diabetes Care* , 47.
6. Canonge, S. (2010). Microangiopatía diabética. Retinopatía diabética. Patogenia, clínica y tratamiento. *Rev Panamericana*, 265.
7. Castro, G. (2016). *Factores de riesgo asociados a la calidad de vida de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2*. Ecuador: Panamericana.
8. Espinoza G. Influencia del estado nutricional y hábitos alimentarios en la presencia de complicaciones en pacientes adultos con Diabetes Mellitus tipo 2. Hospital Distrital Vista Alegre -Trujillo. 2016.
9. fer, L. (2010). Guía del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. *Rev Soc Arg de Diabetes.*, 358-384.
10. Fernandez, L. (2019). Guía del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. *Rev Soc Arg de Diabetes*, 358-384.
11. Fernández L. Día Mundial de Diabetes: Minsa registró más de 8 mil casos entre enero y junio. 2018. Diario el Comercio Perú. (Internet). (Citado 2019, octubre 11). Recuperado de: <https://elcomercio.pe/peru/minsa-registro-8-mil-casos-diabetes-tipo2-enero-junio-noticia-576645-noticia/>.
12. Gómez A. El papel de enfermería en atención primaria para prevenir y detectar las complicaciones de los diabéticos tipo 2.

Universidad del País Vasco, España. 2017. (tesis de titulación) (Citado 2019, octubre 12). Recuperado de: <http://hdl.handle.net/10810/22798>.

13. Guerrero, R. (2019). Cuidado humanizado de enfermería según la teoría de Jean Watson. *Rev enferm Herediana*, 36-17.
14. Hernández R, Fernández C, Baptista M. Metodología de investigación. Sexta edición 2014. México D. F.: Mc Graw-Hill Interamericana editores.
15. Himsworth, H. (2010). Diabetes Mellitus: The differentiation into insulin-sensitive and insulin-insensitive types. *Revista Lancet*, 12-18.
16. Julie, S. (2014). Fisiopatología del metabolismo de los glúcidos. Manual de patología general. . *Revista : Elsevier Masson*, 551-560.
17. Lindstrom, J. (2009). The diabetes risk score: a practical tool to predict type 2 . *Diabetes Care* , 26-31.
18. Lupaca, P. (2013). Percepción del usuario sobre la calidad de atención en el cuidado de enfermería. *Revista LILACS.*, 43-45.
19. Martínez, R. (2015). Epidemiología de la diabetes mellitus en México. *Academia Nacional de Medicina de México*, 21-25.
20. NOM-015. (2010). Prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. *Norma Oficial Mexicana (NOM) 015*, 13-14.
21. OMS, O. M. (2008). *Conceptos Básicos de la Diabetes*. Mexico: OMS.
22. Ramírez N, Cortés B, Galicia R. Continuidad del cuidado: adulto mayor con diabetes tipo 2 y su cuidador, México. *Rev. Enfermería Universitaria*.13 (1). 2016. (internet). (Citado 2019, octubre 12).
23. Ravussin E, Valencia M, Esparza J, Bennett P, Schulz L. Effects of a traditional lifestyle on obesity in Pima Indians. *Diab Care* 1994; 17(9):1067-1074.
24. Ruiz, M. (2011). *Diabetes Mellitus. Cuarta Edición*. España: Editorial Akadia.
25. Safak, G. (2008). *Diabetes mellitus y síndrome metabólico. Fisiopatología. Salud-enfermedad: un enfoque conceptual*. España: Editorial Panamericana pp. 986-1014.

26. She J, Marron P. Genetic susceptibility factors in type 1 diabetes: linkage, disequilibrium and functional analyses. *Curr Opin Immunol* 1998; 10: 682-689.
27. Steven, D. (2019). *Treatment of chronic pancreatitis*. Philadelphia: Whitcomb.
28. Torres, E. P. (2010). *Gastroenterología*. Mexico: McGraw-Hill.
29. Valenti, G. (2016). *Informe Mundial sobre la Diabetes*. México: Scielo.
30. Villajuan B. Estilos de vida y prevención de complicaciones de diabetes mellitus tipo 2, en pacientes diabéticos del centro materno infantil los sureños, Puente Piedra 2018. Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
31. Yactayo M, Cerda M. Nivel de conocimiento y prácticas sobre prevención de complicaciones en pacientes con diabetes mellitus tipo II del programa de daños no transmisibles
32. Zuñiga J. Conocimiento y cumplimiento del régimen terapéutico y la presencia de complicaciones en pacientes diabéticos Tipo II Centro Médico San Francisco de Asís.

ANEXOS



FOTOGRAFÍA 1:En la fotografía presentada se observa como los tesistas aplican el cuestionario correspondiente a la investigación.



FOTOGRAFÍA 2:La imagen de arriba muestra a los tesistas aplicando encuestas para la obtención de datos.



FOTOGRAFÍA 3:La fotografía muestra cómo se siguen recabando los datos de las personas para el proceso de investigación.



FOTOGRAFÍA 4:Imagen donde se observa el proceso de obtención de datos.

CUESTIONARIO

Fecha: 20 de Mayo 2022 N° De Cuestionario: 8.

A continuación se presenta un cuestionario elaborado para fines de investigación, por lo que te pedimos de la manera más respetuosa y sincera responder cada una de ellas o en su caso apoyarnos con los datos solicitados.

Nota: Es importante aclarar que los datos y las respuestas obtenidas serán tratadas con respeto y sobre todo con confidencialidad.

Instrucciones: Lee detenidamente cada una de las preguntas que se te presentan o datos que se te solicitan y posteriormente marca con una línea la respuesta que tu consideres.

I.- DATOS PERSONALES

Nombre: EFRAÍN LIO ESCOBAR

Edad: 79 Sexo: masculino

Escolaridad: secundaria Ocupación: COMERCIANTE

II. DATOS DE CONOCIMIENTO

1.- ¿CONOCE EL CONCEPTO DE DIABETES MELLITUS?

a) Si

b) No

2.- SABE COMO SE CLASIFICA LA DIABETES MELLITUS?

a) Si

b) No

3.- ¿CONOCE ALGUNA MEDIDA PARA PREVENIR COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS?

a) Si

b) No

4.- ¿SABE CUALES SON LAS COMPLICACIONES MAS FRECUENTES EN UN PACIENTE CON DIABETES MELLITUS?

a) Si

b) No

III. DATOS DE LA PATOLOGIA

5.- ¿CUANTOS AÑOS LLEVA PADECIENDO LA DIABETES MELLITUS?

- a) Menos de un año
- b) De 1 a 5 años
- c) De 6 a 10 años
- d) Más de 10 años

6.- ¿LLEVA UN CONTROL ADECUADO DE SU ENFERMEDAD?

- a) Si
- b) No

7.- ¿CON QUE FRECUENCIA MONITORIZA SU NIVEL DE GLUCOSA?

- a) Diario
- b) Cada semana
- c) Cada 15 días
- d) Cada mes

8.- ¿CONSUME ALGUN MEDICAMENTO PARA CONTROLAR LA DIABETES MELLITUS?

- a) Si
- b) No

9.- ¿QUE MEDICAMENTO CONSUME PARA EL CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS?

metformina

10.- ¿LLEVA EL CONTROL DE SU PESO Y TALLA?

a) Si

b) No

11.- ¿UTILIZA ALGUN PRODUCTO PARA EL CUIDADO DE SUS PIES?

a) Si

b) No

12.- ¿CON QUE FRECUENCIA ACUDE AL MEDICO PARA SU CONTROL?

a) Cada mes

b) Cada dos meses

c) Cada seis meses

d) Cada año

13.- ¿TIENE O HA TENIDO ALGUNA COMPLICACION A CAUSA DE LA DIABETES MELLITUS?

a) Si

b) No

14.- ¿ALGUNA VEZ HA RECIBIDO INFORMACION SOBRE LA PREVENCION DE LAS COMPLICACIONES DE LA DIABETES MELLITUS?

a) Si

b) No

15.- ¿REALIZAS ALGUN TIPO DE EJERCICIO O ACTIVIDAD FISICA?

a) Si

b) No

Recomendaciones para prevenir discapacidad por DIABETES

- Controle que los niveles de azúcar en la sangre se mantenga dentro de los valores normales.



- Mantenga su peso adecuado.

- Deberá tener una evaluación periódica de sus dientes y de sus ojos.

- Consulte a su nutricionista para el consumo de una buena alimentación.



- Realice ejercicio físico todos los días.

- Evite el consumo de azúcar y grasas.

- Tome estrictamente los medicamentos indicados por su médico.



- No consumir alcohol ni tabaco.

- Cuide siempre sus pies.

- Si usted es hipertenso, debe tener un control estricto de su presión arterial.



PASIÓN POR EDUCAR

ELABORADO POR:

KAREN JAZMIN CAMPOS CRUZ
NELFO JONATAN DIAZ ROBLERO
CONNY YANINI LOPEZ MENDEZ

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

9° CUATRIMESTRE

DIABETES MELLITUS TIPO II



¿Qué es la DIABETES?



PÁNCREAS: Glándula grande que está localizada detrás del estómago, la cual fabrica insulina y enzimas digestivas.

Es una enfermedad crónica que se manifiesta por niveles altos de azúcar (glucosa) en la sangre.

Estos niveles altos de azúcar en la sangre (hiperglicemia), se debe a que el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina, no logrando pasar el azúcar de la sangre a los órganos por lo que aumenta la cantidad de azúcar en la sangre por encima de lo normal.

¿Cómo saber si tengo DIABETES?

El médico recomienda realizar una prueba de medición de azúcar (glucosa) en la sangre. El valor normal de glucosa; Debe ser menor de 100 mg/dl y mayor de 70 mg/dl.



- Si el valor es mayor de 100 mg/dl; el médico solicita otras pruebas para determinar el diagnóstico definitivo.

Factores de riesgo para adquirir la DIABETES

- Antecedentes de familiares con diabetes.
- Obesidad.
- Colesterol elevado.
- Hipertensión arterial.

Signos y Síntomas

Un nivel alto de azúcar en la sangre puede causar diversos síntomas, por ejemplo:

- ❖ Visión borrosa
- ❖ Sed excesiva
- ❖ Fatiga
- ❖ Orina frecuente
- ❖ Hambre
- ❖ Pérdida de peso




Tratamiento

La diabetes tipo 2 se puede contrarrestar con cambios en el estilo de vida, especialmente bajando de peso con ejercicio y comiendo alimentos más saludables. Algunos casos de diabetes tipo 2 se pueden mejorar con cirugía para bajar de peso.

No hay cura para la diabetes tipo 1.

Complicaciones de la DIABETES

Cuando la diabetes no es tratada a tiempo, el azúcar en la sangre se mantiene con valores muy altos. Y con el correr del tiempo puede dañar los ojos, los riñones, los pies; entre otros, dando lugar a múltiples complicaciones, como la discapacidad y la muerte.



¿Quiénes deben realizarse el examen de glucosa?

- Toda persona mayor de 40 años que no tiene factores de riesgo, deberá realizarse la prueba de glucosa cada 3 años.
- Toda persona mayor de 40 años y que además tenga factores de riesgo; deberá realizarse la prueba de glucosa cada año.
- Si tiene estos síntomas: Orina con mucha frecuencia, aumento de apetito, mucha sed y pérdida de peso; se sugiere realizarse de inmediato la prueba de glucosa.