



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

ALUMNA:

Valeria García Victoria

GRUPO:

6 B

CARRERA:


Lic. Enfermería

PROFESOR:

Víctor Geovani Montero López


Villahermosa, Tab, a de 13 de julio de 2022

PROBLEMAS ABDOMINALES



¿QUE SON?

El dolor abdominal ocurre entre el pecho y las regiones pélvicas. Es un dolor parecido a un cólico, fuerte, palpitante, intermitente o agudo. También se le llama dolor de estómago. La inflamación o las enfermedades que afectan los órganos en el abdomen pueden causar dolor abdominal.



Enfermedad diverticular

Concepto: La diverticulosis es un trastorno que se produce cuando se forman pequeñas bolsas o sacos que empujan hacia afuera a través de los puntos débiles de la pared de su colon.

Etiología: Es posible que los divertículos sean causados por el aumento de la presión intraluminal, que provoca extrusión de la mucosa a través de los puntos más débiles de la capa muscular del intestino, las zonas adyacentes a los vasos sanguíneos intramurales.

Síntomas: estreñimiento, diarrea, dolor abdominal o distensión. Con frecuencia, la diverticulitis causa dolor abdominal que suele ser intenso

Tratamiento: Los tratamientos para la diverticulitis incluyen reposo, antibióticos por vía oral y una dieta líquida. Se deben realizar tratamientos adicionales si su diverticulitis causa problemas.

Epidemiología: se presentan con mayor frecuencia en población occidental y su prevalencia aumenta con la edad (35% en mayores de 60 años, 65% en pacientes de 80 años o más).

Apendicitis aguda

Concepto: La apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.

Etiología: La causa probable de la apendicitis es una obstrucción en el recubrimiento del apéndice que da como resultado una infección.

Síntomas: Dolor repentino que comienza en el lado derecho de la parte inferior del abdomen, Náuseas y vómitos, Pérdida de apetito, Fiebre ligera, Hinchazón abdominal, Flatulencia

Tratamiento: El tratamiento para la apendicitis generalmente implica una cirugía para extraer el apéndice inflamado. Antes de la cirugía, se te puede administrar una dosis de antibióticos para tratar la infección.

Epidemiología: se presenta en cerca de 10% de la población general, con un pico de incidencia entre la segunda y tercera décadas de la vida, siendo la causa más frecuente de abdomen agudo en el adulto joven.

Hernias

Concepto: Una hernia es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo). El saco pasa a través de un agujero o área débil en la capa fuerte de la pared abdominal que rodea el músculo, denominada fascia.



Etiología: Por lo regular, no hay causa clara para una hernia. Algunas veces, se presentan por: Levantar objetos pesados, Hacer esfuerzo al usar el baño, Realizar cualquier actividad que eleve la presión dentro del abdomen

Síntomas: Dolor, Náusea, Vómitos, El bulto no se puede regresar a su posición normal dentro del abdomen.

Tratamiento: La cirugía es el único tratamiento con el que se puede reparar una hernia de manera permanente. La cirugía puede ser más riesgosa para personas con problemas de salud graves.

Epidemiología: representa el 75 % de todas las hernias de la pared abdominal, con un riesgo de por vida de 27 % en hombres y 3 % en mujeres.

PROBLEMAS DE RECTO Y ANO



¿QUE SON?

Los problemas rectales son comunes. Casi todas las personas experimentan algún tipo de comezón, dolor o sangrado del recto alguna vez en la vida. Estos problemas suelen ser de poca importancia y pueden desaparecer por sí solos o con tratamiento en el hogar.

HEMORROIDES

Concepto: Las hemorroides, también llamadas almorranas, son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, similares a las venas varicosas.

Etiología: Las venas alrededor del ano tienden a estirarse debido a la presión y pueden sobresalir o hincharse. Las hemorroides se pueden desarrollar por un aumento de la presión en la parte inferior del recto debido a: Esfuerzo al evacuar los intestinos, Sentarse durante largos períodos en el inodoro, Tener diarrea crónica o estreñimiento, Ser obeso, Estar embarazada

Síntomas: Sangrado asociado a la deposición, Prurito anal, Dolor.

Tratamiento: Una dieta alta en fibras puede resultar efectiva, junto con laxantes. En algunos casos, puede ser necesario hacer un procedimiento médico para quitar la hemorroide y brindar alivio.

Epidemiología: Están presentes en un 35% de la población y suelen aparecer entre los 25 y 55 años, y rara vez por debajo de los 15 años.

FISURA ANAL

Concepto: Una fisura anal es un pequeño desgarro en el tejido delgado y húmedo (mucosa) que recubre el ano.

Etiología: Evacuar heces grandes y duras, Estreñimiento y esfuerzo durante la evacuación, Diarrea crónica, Sexo anal, Parto

Síntomas: Dolor, algunas veces intenso, durante la evacuación intestinal, Dolor luego de la evacuación intestinal que puede durar varias horas, Sangre roja brillante en las heces o en el papel higiénico luego de la evacuación intestinal, Una grieta visible en la piel alrededor del ano, Un bulto pequeño o un fibroma blando en la piel cercana a la fisura anal

Tratamiento: La afección suele curarse sola al cabo de cuatro a seis semanas. El tratamiento consiste en incluir más fibra en la dieta, el uso de laxantes y la aplicación de cremas en la zona afectada.

Epidemiología: sólo 10% de las mujeres y 1% de los hombres se presentan con fisura anal primaria en la línea media anterior (7). De 3%-10% de las fisuras anales ocurren en el período postparto y éstas son usualmente en la línea media anterior

FÍSTULAS ANALES

Concepto: Una fístula anal es el término médico para un túnel infectado que se desarrolla entre la piel y la abertura muscular al final del tubo digestivo (ano).

Etiología: infección en una de las glándulas que se encuentran alrededor del canal anal. Estas glándulas se obstruyen e inflaman las bacterias lo que provoca que proliferen, lo que da lugar al pus

Síntomas: son el dolor en la zona del ano y la presencia de pus o el drenaje de alguna otra secreción de mal olor. El dolor puede ser de intensidad muy variada. Normalmente se siente un dolor más intenso cuando el paciente defeca, se sienta o realiza algún esfuerzo como puede ser estornudar o toser.

Tratamiento: En los casos agudos se puede tratar con antibióticos inicialmente pero después será necesaria la cirugía.

Epidemiología: alrededor de 2 casos/10,000 habitantes en América, con mayor frecuencia entre los 30 y 50 años de edad y una incidencia mayor en los varones