



Mi Universidad

Mapa Conceptual

Nombre del Alumno: Pamela Guadalupe Rueda Ramirez

Nombre del tema: Mapa conceptual Unidad I

Parcial: 2do

Nombre de la Materia: Patología del adulto

Nombre del profesor: Víctor Geovanni Montero Lopez

Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería

Cuatrimestre: 6to

PROBLEMAS ABDOMINALES



Enfermedad Diverticular



CONCEPTO

Los divertículos son bolsas que se forman en las paredes de colon, normalmente en la parte izquierda o colon sigmoide, pero pueden abarcar todo el colon.

ETIOLOGIA

La causa de la diverticulosis y la diverticulitis no se conoce con precisión, pero es más común en las personas que consumen una dieta baja en fibra.

SINTOMAS

- Distensión abdominal
- Estreñimiento o diarrea
- Calambres o dolor en la parte baja del abdomen


TRATAMIENTO

- Dieta rica en fibra
- Suplementos de fibra
- Medicinas
- Probióticos

EPIDEMIOLOGIA

El 65% son mujeres, con una mediana de edad de 61 años. 24,7% de las DA se presentan en menores 50 años, con predominio masculino (78%). 88 pacientes (24%) corresponden a **diverticulitis** aguda complicada (DAC).

Apendicitis aguda



CONCEPTO

Se produce por inflamación del apéndice cecal situado en la porción inicial de intestino grueso localizado en la parte inferior del hemiabdomen derecho.

ETIOLOGIA

No existe una causa única de apendicitis aguda. En ocasiones, el apéndice se obstruye por **heces** o **restos de alimentos** y produce un sobrecrecimiento bacteriano.

SINTOMAS

- Náuseas
- Vómitos
- Pérdida de apetito

TRATAMIENTO

El tratamiento es siempre quirúrgico y consiste en la exéresis del apéndice inflamado y lavado abdominal si el apéndice estuviera perforado.

EPIDEMIOLOGIA

El dolor abdominal es una de las causas más frecuentes de consulta en urgencias. La apendicitis es la causa más frecuente de dolor abdominal agudo en menores de 50 años y la segunda causa en mayores de 50 años.

Hernias

CONCEPTO

Una hernia de la pared abdominal es una protrusión del contenido abdominal a través de una zona adquirida o congénita de debilidad o defecto de la pared.

ETIOLOGIA

Una hernia aparece cuando hay una debilidad o agujero en el peritoneo, la pared muscular que generalmente mantiene los órganos abdominales en su lugar.

SINTOMAS

La mayoría de los pacientes refieren sólo un bulto visible, que puede causar molestias vagas

TRATAMIENTO

Reparación quirúrgica


EPIDEMIOLOGIA

La hernia inguinal es una enfermedad muy frecuente, representa el 75 % de todas las hernias de la pared abdominal, con un riesgo de por vida de 27 % en hombres y 3 % en mujeres.

PROBLEMAS DE RECTO Y ANO



Hemorroides



CONCEPTO

Son venas hinchadas y también inflamadas en el recto y el ano que provocan incomodidad y sangrado.

ETIOLOGIA

son ocasionadas por distensiones durante los movimientos intestinales, la obesidad o el embarazo.

SINTOMAS

- Picazón anal
- Uno o más bultos duros y sensibles cerca del ano
- Dolor anal

TRATAMIENTO

Consumir alimentos ricos en fibra
Tomar un ablandador de heces o un suplemento de fibra
Beber suficientes líquidos todos los días
No hacer mucho esfuerzo durante las deposiciones

EPIDEMIOLOGIA

La mitad de la población mayor de 30 años sufre hemorroides en algún momento de su vida, y la otra mitad las tiene desde el momento del nacimiento, posiblemente sin saberlo.

Fisura anal



CONCEPTO

Se puede definir como una úlcera situada en la parte final del canal anal, de aparición frecuente y que ocasiona grandes molestias en forma de dolor intenso pese a su pequeño tamaño.

ETIOLOGIA

Puede ocurrir al eliminar heces demasiado duras o de gran tamaño.

SINTOMAS

Una fisura anal puede causar dolor y sangrado durante los movimientos intestinales.

TRATAMIENTO

La aplicación de tratamientos tópicos a base de pomadas o cremas que contengan anestésicos locales, antiinflamatorios (corticoides etc.)

EPIDEMIOLOGIA

Se ha reportado una prevalencia que oscila entre los 7 a 15% en las mujeres de la comunidad, del 50 al 70% en centros de cuidado para ancianos.

Fístulas anales

CONCEPTO

Una fístula anal es un conducto infectado entre la piel y el ano, la apertura muscular en el extremo del tracto digestivo.

ETIOLOGIA

Las fístulas anales aparecen como resultado de una infección en una glándula anal que se extiende a la piel.

SINTOMAS

Incluyen dolor, hinchazón y secreciones de sangre o pus del ano.

TRATAMIENTO

- Procedimientos quirúrgicos
- Para fístulas causadas por la enfermedad de Crohn, fármacos

Previamente, el único tratamiento eficaz era la cirugía para abrir la fístula (fistulotomía).

EPIDEMIOLOGIA

Es de alrededor de 2 casos/10,000 habitantes en América, con mayor frecuencia entre los 30 y 50 años de edad y una incidencia mayor en los varones.