

Cambios físicos y comportamiento del celo.

Los ciclos reproductivos en los mamíferos, tienen peculiaridades de acuerdo a la especie, en el caso de los equinos y ovinos, presentan celos de forma estacional, el equino presenta los celos en la época en que el día es más largo, a diferencia del ovino que presenta los celos en la época de días cortos. En el caso del bovino y porcino, presentan celos durante todo el año.

Bovino: el ganado en celo, tendrá un comportamiento diferente a lo normal, estará inquieto, disminuirá el consumo de alimento y la producción de leche bajará, olerá los genitales de otros animales, intentará montar, vocalizará, tendrá descargas de moco y se dedicará a montar por otros vacas.

Canino: la aparición de celos en las hembras está asociada a cambios físicos, como lo es el aumento de la zona genital, mayor circulación y presencia abundante de sangre sobre todo durante la primera etapa del ciclo.

1. en esta fase la hembra atraerá al macho mediante olor, pero rechazará la monta.

2. en esta fase, la pérdida de sangre son menos y la hembra estará más predispuesta a la monta.

3. También puede desarrollar otros comportamientos puede estar más cariola y juguetona.

Observaciones y lesiones del celo

• Celso 196

Yegua hay una serie de signos que indican que la yegua está en celo. y es receptiva a la cobertura del macho.

- Inclina la cabeza abajo la pelvis
- levanta y desuena la cola exponiendo la vulva
- expulsa moco y orina en pequeñas cantidades para atraer al macho
- Enrojecimiento de la vagina
- Vuelve a exposición del clitoris.
- se muestra amigable y cariñosa, se avienta parada y con las orejas atentas a la estira del macho.

Gatas. el celo en las gatas no tiene frecuencia determinada sino que dependerá de distintas variables, como en la raza, el tamaño, la temperatura. Durante el celo la gata mostrará muy nerviosa y requiere la más atención.

Los síntomas varían según la fase:

- **Proestro** fase previa que dura uno o dos días. la gata comienza a mostrar comportamientos del celo y comienza a atraer al macho pero no deja que la monte
- **estro** puede durar entre 2 a 5 días, maullidos, y empieza a restregarse.
- **interestro** son los días entre celos, entre 8 y 16 días
- **Anestro** periodos que se dan durante las estaciones en las que la gata no está en celo