



Nombre de alumno:

Hector Mario Hernández Pérez

Nombre del profesor:

Sandra Guadalupe Hernandez

Nombre del trabajo:

Mapa Conceptual

Materia:

Enfermería Médico-Quirúrgico

Grado:

6. Cuatrimestre

Grupo: "B" Enfermería

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de Enero de 2022.

Cuidados de paciente urológicos y renales

Riñones

Ubicado en la región retroperitoneal, nivel de la 12 vertebra torácica t 3 vertebra lumbar, su tamaño semeja a un frijol

Pesa de 150 a 170 gramos en adulto

Corte frontal se Observa

Seno renal

Parénquima renal

Medula renal

Corteza renal

Nefronas

Tejido conjuntivo

Consta de corpúsculo renal y túbulo renal

Constituidos por capilares glomerulares que es llamada capsula de Bowman

Insuficiencia renal aguda

Síndrome clínico de inicio rápido, por perdida de la función renal y aparición de azoemia

Causa

Lo más común es son la isquemia renal y lesiones nefrotóxicas

3 tipos de IRA

- IRA prerrenal
- IRA infrarrenal
- IRA postrenal

Fisiopatología

Disminución de la filtración glomerular, incremento de niveles séricos de creatinina y BUN

Las fases de IRA

- fase inicial de agresión o lesión-fase oliguria.
- fase diurética
- fase de recuperación

Insuficiencia renal crónica

Destrucción progresiva e irreversible de nefronas de ambos riñones

Causa

Lo más común es la diabetes mellitus, hipertensión y enfermedad de riñones poliquísticos

Fisiopatología

Las nefronas intactas empiezan a trabajar al máximo para el aumento de filtración de solutos

Manifestaciones clínicas

Aparecen debido a sustancias retenidas como, urea, creatinina, fenoles, hormonas, electrolitos, agua y otras cosas.

Diálisis peritoneal.

Procedimiento terapéutico que eliminan sustancias toxicas presentes em la sangre

Tratamiento consiste en dos tipos

Diálisis peritoneal

Técnica que usa el recubrimiento del abdomen y solución conocida como dializado

Debido a la diálisis

Presenta insomnio, fatiga, pérdida de movilidad, cansancio, palidez, hinchazón de pies, y tobillos mal sabor





