



Dra. Rosvani Margine morales Irecta

Leyber Uglises Yafeth Álvarez

Gómez

Mapa conceptual

Primero “A”

Morfología

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de noviembre de 2022.



Hgado

Dividido por Surcos
en

lobulillos:
Izquierda y
derecho

lobulillos
Caudado y
Cuadrado

Divertículo - Diferencia:
epatico

+ Hepatocitos

- Albumas
- Lipoproteinas
- Glucoproteinas
- Protrombina / fibrinogeno
- Globulinas no inmunitarias I y B

Pediculo Se
Convierte en colageno
Paredon coledoco
Conducto biliar (amen) = Diverticulo
Cistico

Da origen

Vesicula Cistrica
Vilias Cistrica

- Vitamina A retinol para vision
- Vitamina D Calciferol
- metabolismo de Calcio y fosforo
- Vitamina K Sintesis epatica de
- Protrombina

- Se Organizan en Cordones
la Paracoma hepatica
- 80% de la poblacion celular
- Citoplasma acidofilo
- Componentes Citoplasmaticos
- Regiones basofilas = RER
- Mitochondrias abundantes
- Multiples Cistojos de golgi
- Peroxisomas (200 a 300)
- Depositos de glucogeno
- Inclusiones Lipidicas

Dr

PANCREAS

Se divide en 4 partes

CABEZA

Se relaciona hacia adelante con el estomago, el Colon y el mesocolon transverso. Por detras se relaciona con el sinpl derecho hilo renal y Vena Cava inferior

CUERPO

Une la cabeza al cuerpo

Limitada por

arriba por la primera porcion del duodeno por abajo por la escotadura mesenterica.

CUERPO

Supramesocolonico.

Su cara anterior se transparenta a traves de la hoja Anterior que constituye la pared posterior de la boba retrogastrica.

COLA

Espesor del epiploon pancreatico esplendico.


hoja Anterior
hoja Posterior

Proceso Unciforme (gancho del pancreas) se proyecta hacia arriba y hacia la izquierda.



Detras de los Vasos mesentericos Superiores

Cara Posterior del cuerpo Pancreas



Vena esplenica



Glándulas Anexas



Tracto Digestivo



Tubo Digestivo

1/2
Anota
Complementar

Esófago

Músculo linfo

mide 40 cm

parte peristaltica

Abanca hno alimenticio

aringe

esófago

intestino delgado

Absorción de nutrientes

Fondo delgado

Vellosidades en todo

Luzo pancreática

Jugo intestinal

Bilis

Estómago

Tubo Ono
Palmo de J

partes

fosco

fondo (muco)

cuape entro poro

Acidos puzina

Quadrato mayor

Quadrato menor

Intestino grueso

Cecocolona

Íleocecal

Colon sigmoide

Colon ascendente

Apéndice

15 cm

Colon transverso

Colon descendente

Handwritten signature or initials in green ink.

FECHA

→ Plana

Vesícula Viliar

Es Un Orogang de Saco Fijo de la Superficie inferior del hígado

La bilis es un líquido verde amarillento

Almacena y concentra bilis

la cual

contiene

→ Drena hacia ella desde el hígado

Gales biliares
Bilirrubina
Colesterol
y diversos compuestos

los conductos biliares epatico y sistico respectivamente.

la esfinterina en el cuello de la vesícula biliar permite la capacidad de almacenamiento de 35 a 100 ml.

La Contracción de la Capacidad muscular de la Vesícula Viliar expulsa bilis a través del Conducto Sistico hacia el Coledoco, el cual produce la bilis. hacia el duodeno