



Yessica del Rocío García Calderón

**Q.F.B. Alberto Alejandro López
Maldonado**

**Enzimas, Hidratos de Carbono,
Lípidos, vitaminas y Minerales.**

Bioquímica

Primero

“B”

Los lípidos se encuentran principalmente en tres compartimientos del cuerpo: el plasma, el tejido adiposo, y las membranas fisiológicas.

Funciones biológicas de los lípidos

1. **Almacenamiento de energía (grasas y aceites):** Triacilgliceroles.
2. **Componentes de las membranas biológicas:** Fosfolípidos. Esfingolípidos. Colesterol.
3. **Otras funciones:** Hormonas, Vitaminas. Mensajeros intracelulares. Componentes de pigmentos, etc.

Ácidos grasos

- Los ácidos grasos existen en forma libre y como componente de lípidos más complejos
- Pueden ser saturados o insaturados, (estos últimos contienen 15 enlaces dobles) y todos ellos tienen geometría Cis.
- Los enlaces dobles no están conjugados, si no separados por grupos de metileno.
- Los ácidos grasos con único enlace doble se denominan monoinsaturados, mientras que aquellos con dos o más enlaces dobles son ácidos grasos poliinsaturados
- Ácidos orgánicos de cadena larga. En los seres vivos abundan los de número par de átomos de C. los más comunes: 16 y 18 C.
- Un solo grupo carboxilo (carboxilato) y una "cola" no polar

Enlaces Cis y Trans

- La mayoría de los ácidos grasos naturales están en configuración cis.
- Los dobles enlaces con configuración cis producen una desviación rígida de la cadena.
- Los ácidos grasos Trans están relacionados con niveles altos de LDL colesterol.

Triglicéridos

- Los triglicéridos son la forma de almacenamiento de los lípidos en el tejido adiposo.
- Ya sea en forma de aceites (líquido) o grasas (sólido). En los seres humanos, los triglicéridos se almacenan en forma sólida (grasa) en el tejido adiposo.
- Son degradados a glicerol y aceites grasos en respuesta a señales hormonales. Y posteriormente se liberan al plasma para ser metabolizados en otros tejidos, y sobre todo en el músculo y el hígado.

Triacilgliceroles = triglicéridos = grasas neutras.

Estructura de las grasas

- Las grasas naturales son mezclas complejas de triacilgliceroles simples y mixtos.
- El 98 % de los lípidos de la dieta son Tag.
- Los triacilgliceroles son ácidos grasos de cadena insaturada tiene puntos de fusión bajos (el punto de fusión de un ácido graso aumenta con la longitud de la cadena y disminuye con el grado de saturación).
- Los Tag son lípidos de reserva: depósito de combustible de reserva en los adipocitos o células grasas.

Fosfolípidos


- Los fosfolípidos son lípidos polares derivados del ácido fosfatídico.
- Los fosfolípidos forman estructuras laminares espontáneamente cuando se dispersan en solución acuosa y, en condiciones adecuadas, se organizan en estructuras extendidas de doble capa, no solo en estructuras laminares, si no también en estructuras vesiculares denominadas, Liposomas

Esteroides

- Los esteroides se construyen alrededor de un característico esqueleto de hidrocarburo de cuatro anillos.
- Uno de los esteroides más importantes es el colesterol, un componente de las membranas de las células animales y un precursor para la síntesis de varias hormonas esteroides, como la testosterona, la progesterona y el estrógeno
- El colesterol está ausente en gran parte de las células

LIPIDOS

Vitaminas y Minerales



Hidratos de Carbono

El principal ciclo energético de la biosfera depende del metabolismo de los carbohidratos

Funciones de los Glúcidos

Energética y estructural

Glúcidos **SENCILLOS** (monosacáridos), que no se pueden descomponer por hidrólisis en otros glúcidos. Empiezan a digerirse con la saliva y generan la inmediata secreción de INSULINA. (miel, mermelada, golosinas)

COMPLEJOS que sí se pueden descomponer en unidades más sencillas por hidrólisis, son de absorción lenta. (cereales, harinas, legumbres, pan, pastas, etc.)

Funciones

1. Son la mayor fuente de energía del organismo, produciendo 4kcal/g.
2. Producen energía de manera muy rápida.
3. Actúan como reserva energética (glucógeno y almidón)
4. Biosíntesis de ácidos grasos a partir del acetil-CoA (lipogénesis)
5. Constituyen moléculas complejas con funciones específicas (glucolípidos, glucoproteínas, ac. Nucléicos, glucoesfingolípidos, etc.)

Funciones de los Carbohidratos

- Aportan fibra: los que no se digieren como celulosa, lignina, gomas; dan volumen a las heces. Cáncer de colon, estreñimiento, hemorroides, obesidad.

- Constituyen a los peptidoglucanos (disacárido) que forman parte de la PC.

- Función estructural: como la celulosa en las células vegetales, o la quitina en el exoesqueleto de artrópodos.

Concepto y clasificación

1. Son biomoléculas formadas por **C-H-O** (en proporción $(CH_2O)_n$ y, en ocasiones, algún átomo de N,S,P.

2. Químicamente son polialcoholes con un grupo **ALDEHÍDO** o **CETONA** con múltiples grupos **HIDROXILO**.

3. Están constituidos por monómeros llamados **OSAS** o **MONOSACARIDOS**

La unión de OSAS da lugar a OSIDOS, que se clasifican:

-HOLÓSIDOS: unión de monosacáridos únicamente

-Disacáridos (2 monosacáridos)

-Oligosacáridos (3-10 monosacáridos)

-Polisacáridos (+ de 10)

-Homopolisacáridos: repetición de un único monosacárido

-Heteropolisacáridos: contienen más de un tipo de monómero

-HETERÓSIDOS: osas + otras biomoléculas (glúcidos, proteínas, lípidos)

GLÚCIDOS = HIDRATOS DE CARBONO = CARBOHIDRATOS

Clasificación

OSAS

-MONOSACARIDOS (glucosa, fructosa)

-POLISACARIDOS

-HOMOPOLISACARIDOS (Almidón, Glucógeno, Celulosa, quitina)

HETEROPOLISACARIDOS (Agar, heparina)

OSIDOS

HOLÓSIDOS (entre 2 y 10 monosacáridos)

-Oligosacáridos (formado por 2 monosacáridos) - Disacáridos (Lactosa, sacarosa)

-HETERÓSIDOS (contienen proteínas y lípidos)

-Glucoproteínas (cerebrósidos)

Diastereoisómeros o Diastéromeros

-Son estereoisómeros que no son imágenes especulares

- Difieren en la orientación de otros carbonos quirales

- Se llaman **epímeros** cuando se diferencian en la posición de 1 único OH distinto al que da la forma D/L

Importancia biológica de monosacáridos

TRIOSAS (Gliceraldehído y Dihidroxiacetona) Intermediarios del metabolismo de la glucosa.

TETROSAS (Eritrosa) Intermediario metabólico.

PENTOSAS, (Ribosa) Componente estructural de nucleótidos, (Xilosa) componente de la madera, (Arabinosa) presente en la goma abariga, (Ribulosa) Intermediario en la fijación de CO_2 en autótrofos

HEXOSAS, (Glucosa) Principal nutriente de la respiración celular en animales, (Fructosa) Actúa como nutriente de los espermatozoides, (Galactosa) Forma parte de la lactosa de la leche, (Manosa) Componente de polisacáridos en vegetales, bacterias, levaduras y hongos

Derivados de los Monosacáridos

OLIGOSACARIDOS

-(3-10 monosacáridos)

-Función: se unen a la membrana celular (normalmente a lípidos o a proteínas) y su función es

-Intervienen en el fenómeno de reconocimiento celular

-Ser zonas de anclaje a otras células o sustancias como hormonas

DISACARIDOS

-semejantes a las de monosacáridos

-Dulces y solubles en agua

-Se pueden hidrolizar (en medio ácido en caliente o con enzimas)

-Son reductores cuando uno de los $C_{anoméricos}$ interviene en el enlace carbonílico

POLISACARIDOS