



**Nombre del alumno:** Rashel Citlali  
Rincón Galindo

**Nombre del profesor:** Sandy  
Naxchiely Molina Roman

**Nombre del trabajo:** Mapas  
Conceptuales

**Materia:** Psicóloga Médica

**Grado:** 1

**Grupo:** B

Comitán de Domínguez Chiapas a 19 de noviembre de 2022.

# DOLOR

Definición

Una experiencia sensitiva y emocional desagradable relacionada con un daño tisular

Clasificación

Evaluación

Tratamiento

Continuo, recurrente y persiste mas  
Allá del tiempo normal de curación

Dolor crónico

Dolor agudo

Definición

Postoperatorio se define como  
Dolor agudo de inicio reciente,  
Autolimitado, que alcanza su  
Máxima intensidad las primeras  
24 horas y luego disminuye.

Aparece

Neuropático: es causado  
por el daño estructural o  
la defunción del sistema  
nervioso o central o  
periférico. Presenta  
hormigueo, ardor o  
Sensación de corrientazo  
o punzada.

Tiene como objetivo  
Medir la intensidad del  
dolor cuantificando la  
percepción subjetiva del  
paciente y de acuerdo  
con ellas implementar  
una adecuada terapia  
analgésica

Métodos

Farmacológico

Según la OMS  
estableció la  
escalera  
analgésica.

1ER escalón

AINES: ácidos orgánicos que tienen  
Como efecto inhibir  
la síntesis de  
ciclooxigenasa y  
tromboxanos.

Paracetamol  
Ketorolaco, Metamizol.

Consecuencia de estimulación nociceptiva,  
Debido a la lesión tisular de diversa etiología  
Como intervención quirúrgica, distensión  
Vesical e intestinal, espasmos musculares  
Lesiones nerviosas, entre otras, las cuales  
Inducen liberación de sustancias  
Sensibilizadoras de nociceptores.

Visceral: Es causado por  
la activación de receptores  
localizados en la cavidad  
torácica, abdominal, y  
pélvica. Suele ser difuso,  
tipo cólico y difícil de ubicar  
O descubrir.

Escala numérica: va de 0 a 100  
Escala visual análoga: de 0 a 10  
La escala de FLACC:  
expresión cara, piernas, actividad,  
llanto y capacidad de consuelo  
(0= nada de dolor y 10 o 100=  
Demasiado dolor.

2do escalón

Opiodes débiles:  
es un agonista de los  
receptores: Tramadol,  
Codeína y la  
Hidrocodona.

Somático: es causado por la  
Activación de receptores  
Presentes en tejidos como:  
Piel, mucosa, músculos,  
Huesos, articulaciones, como  
Respuesta al proceso  
Infamatorio. Suele ser bien  
Localizado y varia de  
Intensidad dependiendo  
De la lesión.

3er escalón


Opiodes Fuertes: receptores  
tiene baja afinidad sobre  
receptores: Morfina,  
Hidromorfona, Oxycodona,  
Fentanilo, Meperidina.

4to escalón



Analgesia multimodal: uso concomitantemente  
Diferentes analgésicos como AINEs, opiáceos,  
Paracetamol y metamizol, antidepresivos o  
Anticonvulsivantes, garantizado un adecuado  
Control del dolor.

# ESTRÉS



Pelea con su pareja

Esquia en una

Pendiente

Cuando se hace

Algo nuevo o

Emocionante.

problemas de dinero

matrimonio infeliz

problemas en el trabajo.

## Bibliografía

Fuente, R. D. (1921-2006). Psicología Medica, En R. d. Fuente, Psicología Médica .