



# UDS

## Mi Universidad

*Litzy Moreno Rojas*

*Parcial: 4°*

*Karina Romero Solórzano*

*Medicina Humana*

*Semestre: 5°*

Mordedura de serpiente o víbora

\* Nayaca

\* Cantil

\* Cascabel

\* Medir edema perilesional por hora

1. Observar mordedura / Grados

2. Suero antiviperino o faboterapicos

\* Torniquete

Clasificación de Christopher - Rodning de los signos y síntomas de envenenamiento por mordedura de serpiente familia Viperidae

Grado	Signos y Síntomas
0	Huellas puntiformes sin envenenamiento, probable mordedura seca (10 a 20% de los casos)
I	Envenenamiento leve: dolor, edema mayor de 10 cm circunscrito al área de la lesión.
II	Envenenamiento moderado: dolor intenso, edema mayor de 15 cm del sitio de lesión, cambios en la piel y los regionales, estado nauseoso.
III	Envenenamiento severo: edema de todo el miembro afectado, vomito, vertigo, fiebre, cambios más notables en la piel (equimosis, bulas, petequias, parestesias, oliguria)
IV	Envenenamiento grave: sangrado en huellas de mordedura, equimosis y petequias extensas, datos de coagulación intravascular, diseminada, insuficiencia renal aguda, dificultad respiratoria, hipotensión y falla orgánica múltiple.