



Jesús Eduardo Gómez Figueroa

Dr. Luis Enrique Guillen Reyes

Clínica quirúrgica

Trombosis venosa profunda

5 semestre

Grupo A

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 de diciembre del 2022

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

Afección que ocurre cuando de forma un coágulo de sangre en una vena profunda. Estos coágulos por lo general se forman en la parte inferior de las piernas, los muslos o la pelvis, pero también puede aparecer en el brazo

CUADRO CLINICO

- Dolor
- Edema
- Hiperemia
- O2 normal
- Parestesia

SIGNOS

Homans

Dolor en la pantorrilla con la flexión dorsal

Ollow

Dolor a la palpación de cordón venosos en la zona poplítea

Pruebas especializadas para detectar TVP

- ✓ Prueba de dímero D en sangre
- ✓ USG Doppler
- ✓ AngioTAC
- ✓ Venografía

Factores de riesgo

- Edad mayor a 40 años
- Inmovilización prolongada
- Cirugía mayor
- Quimioterapia
- Obesidad
- Embarazo y posparto
- Traumatismos

Criterios de Wells

Prevención

- ✓ Hacer ejercicio
- ✓ No fumar
- ✓ Baja ingesta de sal
- ✓ Comer saludable
- ✓ Levantar las piernas 15 cm por arriba del corazón

Complicaciones

- ❖ Embolia pulmonar
- ❖ Síndrome postrombótico

Tratamiento

Anticoagulación con Enoxaparina o Warfarina
Filtro de VCI
Trombólisis por catéter

Referencias

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA. (s. f.). prezi.com. <https://prezi.com/w9zkmqi18lrz/trombosis-venosa-profunda/>

Trombosis venosa profunda (TVP) - Síntomas y causas - Mayo Clinic. (2022, 11 agosto). <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/deep-vein-thrombosis/symptoms-causes/syc-20352557>