



Mi Universidad

Litzy Moreno Rojas

Nombre del tema: historia natural de la enfermedad

Parcial: 3°

Medicina física y de rehabilitación

Dr. Sergio Jiménez Ruíz

Medicina Humana

Semestre: 5°

POLINEUROPATIA

PERIODO PREPATOGENICO		PERIODO PATOGENICO			
TRIADA ECOLOGICA Agente: desmielizacion Huésped: ser humano Medio ambiente: infecciones, sustancias tóxicas, fármacos, cánceres, carencias nutricionales, diabetes, trastornos autoinmunitarios		Debilidad muscular proximal y distal	La polineuropatia comienza en una extremidad.	Alteraciones motoras (debilidad, fatiga, calambres, fasciculaciones); síntomas sensitivos y síntomas autónomos.	Muerte
		PERIODO DE LATENCIA (interacción entre el huésped y agente)	CAMBIOS TISULARES	SIGNOS Y SINTOMAS	DEFECTO O DAÑO
PREVENCION PRIMARIA		PREVENCION SECUNDARIA		PREVENCION TERCIARIA	
Promoción a la salud	Protección especifica	Diagnostico precoz	Tratamiento oportuno	Rehabilitación	
Educación a la promoción acerca de la enfermedad y sus signos y síntomas para una detección temprana	Detección de diabetes mellitus Consumo de alcohol, drogas Infecciones (VIH)	Clínica, PL y EMG. Destacar enfermedades sistémicas, exposición a tóxicos o historia familiar.	Responden a corticoides	Programas de ejercicio físico	
Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel			

PERIODO PREPATOGENICO		PERIODO PATOGENICO			
TRIADA ECOLOGICA Agente: biológicos (virus y otros microorganismos), físicos, químicos. Huésped: ser humano Medio ambiente: antecedentes de haber tenido un embarazo previo con un producto con defecto de cierre de tubo neural, alteraciones de la salud y nutrición materna.		El desarrollo del SNC se inicia en la tercera semana de gestación con la diferenciación del neuroectodermo, el desarrollo de cada etapa puede ser afectado por diferentes agentes lo que resulta en malformaciones.	Raquisquisis Mieloneningocele meningocele	Las manifestaciones clínicas dependen del grado de participación de los elementos nerviosos. Meningocele (no producen signos y síntomas neurológicos, solo se considera un problemas estético) Encefaloceles(se asocia a hidrocefalia)	Muerte
		PERIODO DE LATENCIA (interacción entre el huésped y agente)	CAMBIOS TISULARES	SIGNOS Y SINTOMAS	DEFECTO O DAÑO
PREVENCION PRIMARIA		PREVENCION SECUNDARIA		PREVENCION TERCIARIA	
Promoción a la salud	Protección específica	Diagnostico precoz	Tratamiento oportuno	Limitación del daño	Rehabilitación
Evitar el consumo de tabaco, alcohol, una alimentación sana y actividad física. Alimentación sana de la madre.	Cuidado específico durante el embarazo.	Radiografía simple de raquis anteroposterior y lateral Electromiografía Tomografía axial	Decisión quirúrgica	Evitar el tabaco Alimentación sana	Cirugía
Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel			

PERIODO PREPATOGENICO		PERIODO PATOGENICO			
TRIADA ECOLOGICA Agente: desordenes neurológicos heterogéneos. Genética Huésped: ser humano Medio ambiente: falta de nutrientes o vitaminas en la dieta de la madre en gestación, una infección, traumatismo o intoxicación.		Defectos estructurales del cerebelo.	Desplazamiento inferior del cerebro hacia el canal espinal por el foramen magno, sea un conjunto con la medula inferior o no.	Los síntomas se desarrollan en base de tres consecuencia fisiopatologicas: la compresión de la medula y medula espinal superior, compresión del cerebelo e interrupción del flujo del liquido cefalorraquídeo por el foramen magno.	Muerte
		PERIODO DE LATENCIA (interacción entre el huésped y agente)	CAMBIOS TISULARES	SIGNOS Y SINTOMAS	DEFECTO O DAÑO
PREVENCION PRIMARIA		PREVENCION SECUNDARIA		PREVENCION TERCIARIA	
Promoción a la salud	Protección específica	Diagnostico precoz	Tratamiento oportuno	Rehabilitación	
Promover la enfermedad para mejor estilo de vida.	Alimentación materna Restringir consumo de tóxicos, alcohol y drogas.	Interrogatorio clínico y examen físico, resonancia magnética, rayos X de cabeza y cuello. Tomografía axial computada o TAC. Polisomnografía.	analgésicos para aliviar el dolor cirugía	Cirugía exitosa se define, en estos casos, como aquella que ha conseguido restablecer y normalizar el flujo de LCR	
Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel			

COMPRESION MEDULAR

PERIODO PREPATOGENICO		PERIODO PATOGENICO			
TRIADA ECOLOGICA Agente: genes de determinados clones tumorales Huésped: ser humano Medio ambiente: pacientes con cáncer			Lesiones extramedulares, columna torácica, la lumbar y la cervical.	Dolor, claudicación, disfunción autonómica, parálisis.	Muerte
		PERIODO DE LATENCIA (interacción entre el huésped y agente)	CAMBIOS TISULARES	SIGNOS Y SINTOMAS	DEFECTO O DAÑO
PREVENCION PRIMARIA		PREVENCION SECUNDARIA		PREVENCION TERCIARIA	
Promoción a la salud	Protección específica	Diagnostico precoz	Tratamiento oportuno	Limitación del daño	Rehabilitación
Consulta para detección oportuna	Detección de alteraciones. Manejo adecuado y específico en paciente con cáncer	Historia clínica, la RMN de toda la columna y estructuras adyacentes.	Corticoides Cirugía	Radioterapia	Control del dolor Estabilización de progresión local neoplastia
Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel			