


Tratamiento de *H. pylori*

- Tratamiento de primera elección



• Utilizar un triple ^{cuadruple} esquema durante un periodo de 14 días.

La combinación más eficaz sigue siendo:

- Claritramina 500 mg dos veces al día (c/12hrs)

- Amoxicilina 1 gr dos veces al día e IBP 40 mg cada 12 hrs.

- Metronidazol

SOFA



Sistema	0	1	2	3	4
PaO ₂ /FiO ₂ (mmHg)	>400	<400	>300	<200 con Soporte resp.	<100 con soporte respiratorio
Plaquetas (u/l)	>150	<150	<100	<50	<20
Bilirrubina (mg/dl)	<1,2	<1,2	2,0-5,9	6,0-11,9	>12,0
PAM o so manejo	PAM > 70 mmHg	PAM > 70 mmHg	Dopamina < 5 o dobutamina	Dopamina 5,1-15 o epinefrina < 0,1 o norepinefrina < 0,1	Dopamina > 15 o epinefrina > 0,1 o norepinefrina > 0,1
Glasgow	15	13-14	10-12	6, 9	< 6
Creatinina (mg/dl)	1,2	1,2-1,9	2,0-3,4	3,5-4,9 < 500	> 5,0 < 200

Handwritten notes and symbols (plus signs) at the bottom of the page, possibly indicating clinical status or scores for each parameter.