



Mi Universidad

Jhoana Guadalupe Arreola Mayorga

3er Parcial

Medicina Interna

Karina Romero Solórzano

Medicina Humana

5to semestre

Clasificación de Forrest

		% de recidiva
Ia	Sangrado activo arterial en "jet" o "chorro"	90 %
Ib	Sangrado rezumante o en "sábana"	60-80%
IIa	Vaso visible en el lecho de la lesión	50 %
IIb	Coágulo fresco adherido	25-30 %
IIc	Manchas hemáticas (oscuras)	7-10 %
III	Lesión con base limpia, cubierta por fibrina	3-5 %

Hemorragia digestiva alta

Índice de Rockall

Parámetros	Puntuación		
	1	2	3
Edad	< 60	60 a 79	> 80
FC	< 100	≥ 100	> 100
PAS	> 100	> 100	< 100
Enfermedades asociadas	Ninguna	Cardiopatía, EPOC, DM, ICC, Enf. neurol. anticoagul. etc.	IRC, neoplasia, cirrosis, insuf. hepática.
Diagnóstico	Mallory-Weiss, sin lesión	otros diagnósticos	Neoplasia
Signos de hemorragia reciente	Sin estigmas Hemática	-	Hemorragia activa. Forrest I, IIa y IIb

Riesgo bajo: 0 a 2 puntos

Recidiva: 5%

Mortalidad: 0.1%

Riesgo intermedio: 3 a 4 puntos

Riesgo alto: 5 a 10 puntos

Recidiva: 25%

Mortalidad: 17%

Clasificación de Sarin

Clasificación	Localización	Varices esofágicas	Incidencia %	Tasa de hemorragia %
GOV1	Curvatura menor	Si	14.9	11.8
GOV2	Fondo	Si	5.5	55
IGV1	Fondo	No	1.6	78
IGV2	Cuerpo, antro, píloro	No	3.9	9