



Jesús Eduardo Gómez Figueroa

Dra. Karina Romero Solorzano

Clasificación Forrest y Sarín

Medicina interna

5°A

Comitán de Domínguez Chiapas a 19 de
noviembre del 2022

Clasificación de Forrest de Complicación Hemorrágica por Úlcera

Grado I: a) Hemorragia activa con sangrado a chorro, arterial.

b) Hemorragia activa con sangrado babeante.

Grado II: a) Hemorragia reciente, lesión con vaso visible


b) Hemorragia reciente, lesión con coágulo adherido

c) Hemorragia reciente, lesión con mancha pigmentada.

Grado III: Úlcera sin estigma de sangrado.

SANGRADO	TIPO	DESCRIPCIÓN	% Resangrado
ACTIVO	I A	En Jet (a Chorro)	90 %
	I B	En rupa (Babeante)	20-30 %
RECIENTE	II A	Vaso visible (no sangrante)	30-51 %
	II B	Coágulo Rojo (Adherido)	25-41 %
	II C	Todo úlceras hemático	0-5 %
SIN SANGRADO	III	Lesión limpia (Sin estigma)	0-2 %

CLASIFICACIÓN DE ROCKALL



Variables	Puntos			
	0	1	2	3
Edad (años)	< 60	60-79	> 80	-
Frecuencia cardíaca (lat/minuto)	< 100	≥ 100		-
Tensión arterial sistólica (mmHg)	≥ 100		< 100	-
Comorbilidad	Cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, cualquier otra comorbilidad mayor		Insuficiencia renal, cáncer	

CLASIFICACIÓN DE SARTIN

Clasificación	Localización	Varices esofágicas	Incidencia %	Tasa hemorrágica %
G0V1	Curvatura menor	SI	14.9	11.8
G0V2	Fondo	SI	5.5	55
IGV1	Fondo	NO	1.6	78
IGV2	Cuerpo, antro, píloro	NO	3.9	9