

# AKIN

Lesión renal aguda

	↑ Creatinina Sérica*	↓ Volumen Urinario*
1 (Risk)	≥ 0.3 mg/dl ó ≥ 1.5-2 veces el Valor basal	< 0.5 ml/kg/h x > 6 hrs
2 (Injury)	> 2-3 veces el Valor basal	< 0.5 ml/kg/h x > 12 hrs
3 (Failure)	> 3 veces el valor basal ó cr ≥ 4 mg/dl y ↑ aguda ≥ 0.5 mg/dl (o TRS <sup>1</sup> )	< 0.5 ml/kg/h x > 24 hrs o anuria x 12 hrs.

	Creatinina	TFG	Diuresis
R Risk	riesgo x 1.5 su valor basal	< 25%	< 0.5 ml/kg/h 6h
I Injury	Lesión x 2 su valor basal	150%	< 0.5 ml/kg/h en 12h
F Failure	Fracaso x 3 su valor basal	< 75%	< 0.3 ml/kg/h 24h
L Loss	Pérdida	Perdida de la función renal ≥ 4 semanas	Anuria en 12h
E End-stage	Fracaso renal terminal	Perdida de la función renal ≥ 3 meses	

"Agua de arroz" tolera  
 (V. absolutos)  
 1500 ↓ neutropenia

doxiciclina 700 mg vo, du  
 300 mg  
 T D R C H  
 O X P  
 I a S M  
 a

Prerenal aguda - líquidos vasopresores  
 posrenal aguda - TX + diálisis + cirugía