

Rudy Ángel Osvaldo Vázquez  
Zamorano

Dr. Karina Romero Solórzano

“HELICOBACTER PYLORI”

5-º. Semestre.

“A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 19/11/20

## Traatamiento de erradicación de *H. Pylori*

### Traatamiento de primer elección ✓ ↓

Utilizar un triple esquema durante un periodo de 14 días.

La combinación más eficaz sigue siendo:

- Claritromicina, 500 mg dos veces al día;
- Amoxicilina 1 gr dos veces al día
- IBP 40 mg cada 12 hrs.
- Metronidazol



## Escala SOFA

Criterios	0	1	2	3	4
SNC Escala de Glasgow	15	13-14	10-12	6-9	≤ 5
Renal Creatinina (mg/dl) Diuresis (ml/hr)	≤ 1.2	1.2-1.9	2-3.4	3.5-4.9 o ≤ 500	> 5.0 o ≤ 200
Hepático Bilirrubina (mg/dl)	≤ 1.2	1.2-1.9	2-3.9	6-11.9	> 12
Coagulación Plaquetas $10^3/mm^3$	≥ 150	≥ 100	≥ 100	≤ 50	≤ 20
Respiratorio PaO <sub>2</sub> /FiO <sub>2</sub> (mmHg)	≥ 400	≤ 400	≤ 300	≤ 200 y soporte ventilatorio	≤ 100 y soporte ventilatorio
Cardiovascular TAM (mmHg) Drogas vasodil. (mg/kg/min)	≥ 70	≤ 70	Dopamina a ≤ 5 o dobutamina a cualquier dosis	Dopamina a 45 o 5 norepinefrina o adrenalina ≥ 0.4	Dopamina 7.5 norepinefrina o adrenalina ≥ 1