



Jazmín Hernández Morales

Romero Solorzano Karina

TRABAJO

Medicina Forense

5 SEMESTRE grupo B

MEDICINA HUMANA


Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de septiembre del 2022

DIFERENCIAS SEXUALES DE LA PELVIS


MORFOLOGÍA	HOMBRE	MUJER
EN GENERAL	Pesada, rugosa, con inserciones musculosas marcadas	Más liviana, lisa. con inserciones leves
CONTORNO PELVIS	En forma de corazón	Circular, más espaciosa
MENOR PELVIS ILION	Relativamente pequeña	Espaciosa, superficial, oblicua
ARTICULACIÓN SACRO-ILIACA	Grande	Pequeña, más oblicua
Acetábulo	Grande, dirigido lateralmente	Pequeño, dirigido ^{anterior} lateral
Rama Isquiopúbica	Ligeramente ev. t. do. convexo	Marcadamente ev. t. do. convexo
Agujero Obturador	Grande, oval	Pequeño triangular
Cuerpo del Pubis	Triangular	Rectangular
SINFISIO	Alta	Baja
Angulo subpúbico	Estrecho, en forma de "V"	Amplio, en forma de "U"
Sacro	Largo, estrecho suavemente curvo	Corto, ancho, ^{marcadamente} curvo en 2-2



PELVIS FEMENINA.




PELVIS masculina.



UNIONES ÓSEAS

CENTROS PRIMARIOS DE OSIFICACIÓN	MOMENTO DE LA UNIÓN
Fontanelas	
Esfenoide y mastoide	Se cierra después del nacimiento
Occipital	Se cierra después del primer año
Frontal	Se cierra después del 2° año
Mandíbula	
Sin fisia	La Unión se completa en el 2° año
Hueso Frontal	
Sutura metópica	Permanece abierta en 8-9% de individuos blancos. Cuando se cierra, empieza hacia lo en el 2° año
Atlas	
Posteriormente	La Unión ocurre en el tercer año
Anteriormente	
Axis	
Apófisis odontoides, Cuerpos y ^{las dos} mitades de arco	La Unión de las cuatro partes ocurre durante el tercer y cuarto año
Occipital	
Escama con partes laterales	
Partes laterales con partes basilares	



MORFOLOGIA SEGUN LAS RAZAS blancas y Negras y amarillas de orbitas, fosas, nasales

	Orbitas	Fosas Nasales	Maxila	1er molar inferior	Incisivo Superior
Blanca (caucasoides)					
Negra (Negroides)					
Amarilla (mongoloides)					



UNTOS DE OSIFICACION

