

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Medicina Humana

Nombre del alumno: Yamili Lisbeth Jiménez Arguello.

Nombre del docente: Dr. Luis Enrique Guillen Reyes.

Nombre del trabajo: Trombosis venosa profunda.

Materia: Clínica quirúrgica.

Grado: 5° Grupo: B.

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

Es la coagulación de la sangre en una vena profunda de un miembro o de la pelvis

Es la causa principal de embolia pulmonar

Factores de riesgo

- Edad >60 años
- Cáncer
- Tabaquismo
- Moduladores de los receptores de estrógeno

Fisiopatología

Miembro inferior

Alteración del retorno venoso

Lesión o disfunción endotelial

Hipercoagulabilidad

Miembros superiores

Lesión endotelial generada por catéteres venosos centrales, marcapasos o drogadicción intravenosa

Complicaciones

Insuficiencia venosa crónica

Síndrome posflebítico

Embolia pulmonar

Signos y síntomas

Afecta principal a las grandes venas en la parte inferior de la pierna y el muslo

- Enrojecimiento
- Dolor de pierna
- Edema
- Piel que se siente caliente al tacto

Diagnóstico

La anamnesis y el examen físico ayudan a determinar la probabilidad de que el paciente presente una trombosis venosa profunda (antes de la evaluación)

Ecografía

Identifica trombos mediante la visualización directa de la cubierta venosa y demostración de alteraciones en la compresibilidad de las venas

En ocasiones, medición del dímero D

Es un subproducto de la fibrinólisis, el aumento de su concentración sugiere la aparición reciente y la lisis de trombos