



Arguello Tovar Avilene Del Rocío

Dr. Guillén Luis Enrique

Ejercicios de práctica

Clínica Quirúrgica

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 5 B

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de diciembre del 2022

Causa más frecuente en embolia pulmonar

Coágulo a nivel de las venas profundas de los miembros inferiores.

Conocida como tromboflebitis profunda.

Se refiere a inflamación que es potencialmente generadora de trombos o coágulos.

Triada de Virchow

- ① Estasis (entorpecimiento del flujo)
- ② Hipercoagulabilidad
- ③ Lesión endotelial

Etiología

Formación de trombos en las venas del sistema profundo con oclusión total o parcial de la luz.

Trombosis venosa profunda.

Causas

1. Inmovilización
2. Cirugías
3. Ingreso hospitalario
4. Insuficiencia cardíaca
5. Dispositivos / catéteres intravasculares
6. Neoplasias

Signos Clínicos

Signo de Homans
Dolor en pantorrilla con la flexión dorsal del pie mientras la rodilla está flexionada 30°

Signo de Olshw
Dolor a la palpación de un cordón venoso en la zona poplitea.

Tratamiento

- ① **Várices pequeñas:**
 - Elevar las piernas periódicamente
 - Evitar estar mucho tiempo sentado
 - Evitar sobrepeso
 - Ropa ajustada (cintur)

- ② **Mayor compromiso:**
 - Flebotomías o escleroterapia
 - Fleboextracción de la vena

Manifestaciones clínicas

- ① Hinchazón o inflamación de pierna afectada.
- ② Dolor o sensibilidad en la pierna, comenzando en pantorrilla.
- ③ Aumento de la temperatura de la pierna
- ④ Cambio de coloración de la piel (enrojecida o azulada y brillante)

Métodos diagnósticos

- ① Ecografía doppler
- ② Pletismografía de impedancia
- ③ Angio TAC
- ④ Venografía