



MEDICINA HUMANA

Jhair Osmar Roblero Díaz

Sergio Jiménez Ruiz

control de lectura

Medicina física y de rehabilitación

5°

“B”

Comitán de Domínguez Chiapas a 06 de enero de 2023

Escalas de evaluación en la discapacidad pediátrica

Escalas de evaluación del desarrollo psicomotor

1° **Alberta Infant Motor Scale:** creada en Alberta, Canadá en 1994 por Martha C Piper y Johana Darrak. Realiza el análisis observacional de la actividad motora espontánea, desde el recién nacido hasta los 18 meses. Evalúa bebés de riesgo neurológico. El teste comprende 52 puntos basados en descripciones del control postural en decúbito prono, supino, sedestación y bipedestación.

2° **Escala Hazza-Llevant (1991):** desarrollada por Fernández Álvarez, es el resultado de dos programas: estudios Llevant (Cataluña) y Hazzea (País Vasco). Permite comprobar el nivel de desarrollo cognitivo, social y motor de 0 a 5 años.

3° **The Bayley Scales of Infant Development (1993):** de administración individual y para niños desde el nacimiento hasta los 2,5 años. Está constituida por escala mental, de psicomotricidad y del comportamiento.

4° **Guía Portage:** es una guía de educación preescolar que ha sido elaborada para evaluar el comportamiento del niño y planear un programa de estudios (currículum). Permite determinar las capacidades generales de los niños y entre ellas están las capacidades lingüísticas. Consta en una serie de listados

Escalas y pruebas de valoración funcional y cognitiva en el mayor

Dr. Sergio Jimenez Ruiz

Escalas y pruebas en la valoración funcional

Constituye el mejor indicador de salud global en la persona mayor y su alteración puede tener origen en variaciones de otras áreas (física, mental o social), pronóstico en cuanto a eventos adversos de salud, progresivo deterioro o mayor discapacidad o dependencia.

Escala de valoración de las actividades básicas de la vida diaria

Las ABVD valoran el autocuidado y las necesidades básicas para que el paciente pueda mantenerse autónomo en su medio inmediato, su domicilio comer, desplazarse, asearse, vestirse, contener eónteres.

Índice de Barthel

Constituye la escala más extendida para valorar la ABVD fundamentalmente en pacientes domiciliarios o con deterioros más notables, en rehabilitación, para la valoración de minusvalía, discapacidad o dependencia.

• Rango alto y discriminante, tanto de funciones diferentes aspectos de movilidad, de autocuidado, de continencia

Bibliografía

LESENDE, I. M. (s.f.). Obtenido de Escalas y pruebas de valoración funcional y cognitiva en el mayor: <https://amf-semfyc.com/es/web/articulo/escalas-y-pruebas-de-valoracion-funcional-y-cognitiva-en-el-mayor>

Yuneisys Coronados Valladares, E. D. (29 de 12 de 2017). Obtenido de Escalas de evaluación en la discapacidad pediátrica: <https://revrehabilitacion.sld.cu/index.php/reh/article/view/242/330>