



PASIÓN POR EDUCAR



**Nombre del alumno: Jazmín Hernández Morales**

**Nombre del profesor: Romero Solorzano Karina**

**Nombre del trabajo: Choque hipovolémico**

**Materia: Medicina Interna**

**Grado: 5°B**

# CHOQUE HIPOVOLEMICO

24-Oct-2022

SIGNOS y SÍNTOMAS DE HEMORRAGIA POR GRADOS				
	CLASE I	CLASE II	CLASE III	CLASE IV
Pérdida de Sangre	<15%; <750 ml	15-30% <750 - 1500 ml	31-40% 1500 - 2000 ml	>40% >2000 ml
Pulso	-	- / 100 - 120 lpm ↑	120 - 140 lpm ↑	>140 lpm
TA	-	-	- / Hipotensión	Hipotensión
Respiración	14-20	↑ 20-30	30-40	>40
Gasto Urinario	Normal >30 ml	↓ 20-30 ml	5-15 ml	<15 ml
Glasgow	- / leve-ansioso	Ansioso	confuso	letárgico
Deficit de base	0 a 2	- 2 a 6	- 6 a 10	- 10 o inferior
Hemoderivados	Monitorizar	Posible (cruzar)	Si requiere	Transfusión masiva
Restitución de líquidos	-	Cristaloides	Cristaloides + sangre	Cristaloides + sangre.

(-) normal

Siempre debemos cruzar al paciente  
(se tarda 1 hora)

Fluido terapia: IN.

- 1 L adultos
- 20 ml/Kg pediátrico

Hemoderivados

En caso de no saber tipo de sangre, → pasar O  
Si requiere urgente y AB en caso de requerir plasma.

Urcos

- Adultos - 0.5 ml / Kg / h
- Pediátricos > 1 año: 1 ml / Kg / h

Transfusión masiva: >10 pag en 24 hrs o >4 en 1hr