



**Nombre del alumno: Hernández  
Morales Jazmín**

**Nombre del profesor: Romero  
Solorzano Karina**

**Nombre del trabajo: Clasificación de  
rifle y aki**

**Materia: Medicina interna**

**Grado: 5°B**

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de Enero del 202

# CLASIFICACIÓN RIFLE

29.11.22

Escala para evaluar la lesión renal aguda en base a los niveles de creatinina sérica, y la disminución del volumen urinario.

	↑ Creatinina sérica	↓ TFG	↓ volumen urinario
Riesgo	x 1.5 o valor basal	↓ < 25%	< 0.5 ml/kg/h en 6 h
Lesión	x 2 o valor basal	↓ < 50%	< 0.5 ml/kg/h en 24 h o anuria en 12 h
Fracaso	x 3 o valor basal	↓ < 75%	< 0.3 ml/kg/h en 24 h o anuria en 12 h
Perdida	pérdida de la función renal > 4 semanas		
Fracaso renal terminal	pérdida de la función renal > 3 meses		

## LESIÓN RENAL AGUDA, CLASIFICACIÓN AKIN (Rifle modificada)

	↑ Creatinina sérica →	↓ Volumen Urinario →
1 Riesgo	≥ 0.3 mg/dl o ≥ 1.5-2 veces al valor basal	< 0.5 ml/kg/h x > 6 hrs.
2 Lesión	> 2-3 veces el valor basal	< 0.5 ml/kg/h x > 12 hrs
3 Fracaso	> 3 veces el valor basal o > 4 mg/dl y ↑	< 0.5 ml/kg/h x 24 hrs o anuria x 12 horas

aguda ≥ 0.3  
mg/dL

Basta un criterio (cr sérica o volumen urinario) para calificar en un estadio