



PASIÓN POR EDUCAR



**Nombre del alumno: Jazmín
Hernández Morales**

**Nombre del profesor: Romero
Solorzano Karina**

**Nombre del trabajo: tratamiento
helicobacteri pylori y choque séptico**

Materia: medicina interna

Grado: 5°B

TRATAMIENTO DE HELICOBACTER PYLORI

3 / Nov / 2022

Terapia triple

- ▶ Amoxicilina 1gr → Cada 12 hrs
- ▶ Omeprazol 20mg → Cada 12 hrs
- ▶ Claritromicina 500mg → Cada 12 hrs

✓ 11
14 días

Metronidazol 500mg c/12h

Terapia secuencial

Primeros 5/7 días

- ▶ Amoxicilina 1gr → Cada 12 hrs
- ▶ Omeprazol 20mg → Cada 12 hrs

Siguientes 6/7 días

- ▶ Claritromicina 500mg → Cada 12 hrs
- ▶ Omeprazol 20mg → Cada 12 hrs
- ▶ Metronidazol 500mg → Cada 12 hrs

10 o 14 días

Terapia

Concomitante

- ▶ Amoxicilina 1gr → Cada 12 hrs
- ▶ Omeprazol 20mg → Cada 12 hrs
- ▶ Claritromicina 500mg → Cada 12 hrs
- ▶ Metronidazol 500mg → Cada 12 hrs

10-14 días

Terapia Cuádruple

basada en bismuto (BOT)

- ▶ Subsalicilato de bismuto 300mg → Cada 6 hrs
- ▶ Omeprazol 20mg → Cada 12 hrs
- ▶ Metronidazol → 500 mg → Cada 12 hrs
- ▶ Amoxicilina 1gr → Cada 12 hrs

10-14 días

personas con alergias → Amoxicilina.

Segunda línea

- ▶ Levofloxacina → 10-14 días (recomendación fuerte)
- ▶ Levofloxacina → 10-14 días (recomendación condicional)
- ▶ Levofloxacina → 10 días (recomendación condicional)

8/Nov/2022

ESCALA SOFA

¿QUÉ ES?

Evaluación de la aparición y evolución del fallo multiorgánico

SOFA

0-3: Difusión orgánica
>4: Fallo multiorgánico

	0	1	2	3	4
Respiración					
PaO ₂ /FiO ₂ (mmHg)	>400	<400	<300	<200	<100
So ₂ /FiO ₂ (mmHg)		221-301	142-220	67-141	<67
Coagulación					
Plaquetas (10.000/mm ³)	>150	<150	<100	<50	<20
Hígado					
Bilirrubina (mg/dL)	<1,2	1,2-1,9	2-5,9	6-11,9	>12
CARDIOVASCULAR					
TAM (mmHg)	>70	<70	Dopamina ²⁵ Dobutamina	Dopamina 5-15	Dopamina >15
medicación			Cualquier Dosis	Noradrenalina na <0,1	Noradrenalina na >0,1
SNE					
Escala de Glasgow	15	13-14	10-12	6-9	<4
Renal					
Creatinina (mg/dL)	<1,2	1,2-1,9	2-3,4	3,5-4,9	>5
Diuresis (ml/día)				<500	<200