



MEDICINA HUMANA

**Nombre del alumno: Sanchez Chanona
Jhonatan**

Docente: Dra. Karina Romero Solorzano

Nombre del trabajo: Lesión renal Crónica

Materia: Medicina Interna

Grado: 5°

Grupo: "B"

DIFERENCIA ENTRE SINDROME NEFRITICO Y NEFROTICO

Síndrome nefrótico.

- Edema
- Hipoalbuminemia ($< 3 \text{ g/dL}$)
- Proteinuria ($> 3,5 \text{ g/día}$)
- Hiperlipidemia: Compensación hepática por hipoalbuminemia

Enfermedades: Cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa
Vasculitis, amiloidosis.

Síndrome nefrítico.

- Hipertensión
- Azotemia
- Oliguria
- Hematuria (con o sin cilindros)
- Proteinuria variable

Enfermedades: Glomerulonefritis postestreptocócica, glomerulonefritis por LES, GN rápidamente progresiva.

INDICACIÓN PARA INICIO DE DIALISIS EN AGUDO

- Oliguria: Vol urinario $< 200 \text{ ml}$ en 12 h
- Anuria: Volumen $< 50 \text{ ml}$ en 12 h
- Hiperkalemia. $6,5 \text{ mEq/L}$
- Acidosis severa: $\text{pH} < 7,0$
- Hiperazoemia: Concentración de urea $> 200 \text{ mg/dL}$
- Edema agudo pulmonar
- Encefalopatía urémica
- Neuropatía Urémica
- Pericarditis Urémica
- Hiponatremia severa