



Arguello Tovar Avilene Del Rocío

Dra. Romero Solorzano Karina

**Tratamiento del Helicobacter Pylori
SOFA**

Medicina Interna

Grado: 5 B

Comitán de Domínguez Chiapas a 19 de diciembre del 2022

03/11/22

Esquema de tratamiento de primera línea


Terapia	Fármaco / Dosis	Frecuencia	Duración
Terapia Triple (CTT) *	Metronidazol 500 mg	cada 12h	14 días
	◦ Amoxicilina 1gr	cada 12 hrs	
	◦ Omeprazol 20 mg	Cada 12 hrs	
	◦ Claritromicina 500 mg	Cada 12 hrs	
	Primeros 5/7 días:		
	◦ Amoxicilina 1gr	◦ Cada 12 hrs	
Terapia Secuencial (ST)	◦ Omeprazol 20 mg	◦ Cada 12 hrs	10 a 14 días (en total)
	Siguientes 5/7 días		
	◦ Claritromicina 500 mg	◦ Cada 12 hrs	
	◦ Omeprazol 20 mg	◦ Cada 12 hrs	
	◦ Metronidazol 500 mg	◦ Cada 12 hrs	
	◦ Amoxicilina 1gr	◦ Cada 12 hrs	
Terapia Concomitante (CT)	◦ Omeprazol 20 mg	◦ Cada 12 hrs	10-14 días
	◦ Claritromicina de 500 mg	◦ Cada 12 hrs	
	◦ Metronidazol 500 mg	◦ Cada 12 hrs	
Terapia cuádruple basada en bismuto (BQT)	◦ Subsalicilato de bismuto 300 mg	◦ Cada 6 hrs	10-14 días
	◦ Omeprazol 20 mg	◦ Cada 12 hrs	
	◦ Metronidazol 500 mg	◦ Cada 12 hrs	
	◦ Amoxicilina 1gr	◦ Cada 12 hrs	

* En personas con alergia a amoxicilina, éste será sustituido por metronidazol.

Tratamiento de segunda línea

- ① Terapia cuádruple sin levofloxacino de 10 o 14 días (Recomendación fuerte)
- ② Terapia cuádruple con levofloxacino de 10 o 14 días (Recomendación condicional)
- ③ Terapia secuencial con levofloxacino de 10 días (Recomendación condicional)

SOFA



► Disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia

	0	1	2	3	4
Respiración	> 400	< 400	< 300	< 200	< 100
PaO ₂ / FIO ₂ (mmHg) o SaO ₂ / FIO ₂		211 - 301	12 - 220	67 - 141	< 67
Coagulación	> 150	< 150	< 100	< 50	< 20
Plaquetas 10 ³ /mm ³					
Hígado	< 1,2	1,2 - 1,9	2,0 - 6,9	6,0 - 11,9	> 12,0
Bilirrubina (mg/dL)					0
Cardiovascular	PAM	PAM	Dopamina a dosis de < 5 o dobutamina a cualquier dosis	Dopamina a dosis de 5 - 15 o Epinefrina a < 0,1 o Norepinefrina a < 0,1	Dopamina a dosis de > 15 o Epinefrina > 0,1 o Norepinefrina > 0,1
Tensión arterial	> 70 mmHg	< 70 mmHg			
Sistema Nervioso Central	15	13 - 14		6 - 9	< 6
Escala de Glasgow				3,5 - 4,9	
Renal	< 1,2	1,2 - 1,9		< 500	> 5,0
Creatinina (mg/dL)					< 200
o flujo urinario (mL/d)					

Infección + variación ≥ 2 ptos en la escala