[Año]

Astenia , dolor,

GERIATRIA

PRISCILA VANESA ROJAS TORRES
GERARDO CANCINO

Dolor
Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión tisular
Clasificación
Neuropático
Irruptivo
Distrés emocional
Dependencia química
Dolor espontaneo, en forma de crisis con o sin manifestaciones de hiperexcitabilidad
Exacerbación intermitente o transitoria de dolor intenso
Puede asociarse a conflictos, miedos, soledad, psicosocial, espiritual
Influye en la experiencia dolorosa con tendencia asolicitar analgésicos,
Tratamiento etiologico
Ajuste en la dosis de
Control de efectos secundarios
Tolerancia rápida
Dolor difícil
Manejo
Procedimientos anestésicos
Valorar rotación de opioides
Apoyo emocional
Revisión tratamiento adyuvantes

Fármacos
Metilfenidato ha demostrado eficaz en el alivio de la astenia en pacientes con infecciones y px oncologicos
Tratamiento etiologico
Farmacológicos metabometabolicos
Rehabilitación
Astenia
Debilidad
Componente físico como la perdida de la capacidad de llevar acabo una actividad o afán de descansar
Sintoma con mayor prevalencia
Alteración del estado general
Diagnostico
Pruebas de esfuerzo, escala vusal análoga, historia clínica
Manifestaciones clínicas
Cansancio , desgane, la apatia, la hiporexia, astenia depresión,