



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**CARRERA: MEDICINA HUMANA**

**MATERIA: MEDICINA PALIATIVA**

**ESCALERA DEL DOLOR**

**VIVIANA EDIITH ROJAS TORRES**

**6° SEMETRE**

Paracetamol: 1 g / 6-8 hrs/ VO

Efectos: toxicidad hepática, daño renal en dosis elevadas

Metamizol: 1-2 g / 6 hrs / IM, VO, IV lenta

Efectos: agranulocitosis, lesiones gástricas, hipotensión

Ibuprofeno: 200 a 400 mg cada 4 a 6 horas / VO

Naproxeno: 200 mg/8-12 hrs/ VO

Diclofenaco: 25 mg/4-6 hrs / VO

Efectos aines: úlceras pépticas, perforación o hemorragia gastrointestinal, dolor epigástrico, cefaleas, náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia, constipación,

Aspirina: 500 mg/4-6 hrs/ VO

Reacción adversa: Aumento del riesgo de hemorragia

**DOLOR LEVE  
EVA 1-3**

Tramadol: 50 a 100 mg cada 8 horas.

Efectos: Mareo, náusea, vómito, boca seca, cefalea, palpitations, taquicardia, bradicardia, disnea, anorexia, diarrea, agitación, ansiedad, nerviosismo, desorden gastrointestinal

Codeína: 1 comprimido/ 6 h / VO

Efectos: Mareos, somnolencia, convulsiones; estreñimiento, náuseas, vómitos

**DOLOR  
MODERADO  
EVA 4-6**

Morfina: 5 a 20 mg cada 4 horas/ IM, según la respuesta terapéutica

Efectos: Depresión respiratoria, náusea, vómito, urticaria, euforia, sedación, broncoconstricción, hipotensión arterial ortostática, miosis, bradicardia, convulsiones y adicción

Fentanilo: 4.2 mg cada 72 horas/transdérmica

Efectos: Depresión respiratoria, sedación, náusea, vómito, rigidez muscular, euforia, broncoconstricción, hipotensión arterial ortostática, constipación, cefalea, confusión, alucinaciones, miosis, bradicardia, convulsiones y prurito.

**DOLOR  
SEVERO EVA  
7-10**

Coadyuvantes: amitriptilina, carbamazepina, gabapentina  
Corticoides: dexametazona, prednisona,  
Benzodiazepinas: alprazolam, diazepam, clonazepam, midazolam  
Neurolépticos: clorpromazina, haloperidol, levopromacina  
Bifosfonatos: baclofeno