

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Humana

Materia:

Inmunoalergias

Cuadro sinóptico:

Tratamiento de elección para alergia medicamentosa, alimentaria y anafilaxia.

Docente:

Dr. Diego Rolando Martínez Guillen

Alumno:

Víctor Eduardo Concha Recinos

Semestre y Grupo:

8° "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 14 de Noviembre de
2022.

ALERGIA

Alimentaria, medicamentosa,
anafilaxia (Tratamiento de
elección)

ALIMENTARIA

EVITACIÓN

El tratamiento de elección es evitar comer el o los alimentos causantes, tanto en las alergias mediadas por IgE como en las no mediadas por IgE y mixtas

ADIESTRAMIENTO

Procurar hacerle ver al paciente que es importante leer las etiquetas de los alimentos pues la causa más frecuente de la ingesta accidental es la falta de información del paciente

MEDICAMENTOSA

FASE AGUDA

En la fase aguda resulta fundamental el tratamiento de la anafilaxia: esta es una reacción aguda generalizada, debida a la liberación sistémica súbita de los mediadores de los mastocitos y de los basófilos.

TRATAMIENTO SECUNDARIO

Antihistamínicos: Son útiles para prevenir la segunda oleada de mediadores
Esteroides: Son de utilidad para prevenir la respuesta secundaria
Broncodilatadores (Beta 2 agonistas): En caso de asociar broncoespasmo persistente

ANAFILAXIA

VALORAR ABCDE

en la anafilaxia la adrenalina es la única medicación de primera línea y se incluye dentro de la valoración inicial

ADRENALINA

La adrenalina se debe administrar por vía intramuscular

La dosis es 0,01 mg/kg de adrenalina sin diluir (max. .5ml) en caso de no hacer efecto repetir de 5-15 minutos después.