



universidad del sureste



**Asignatura:**  
Interculturalidad I

**Nombre del trabajo:**  
Signos y síntomas

**Catedrático:**  
DR. RICARDO ACUÑA DE SAZ

**Nombre de alumno:**  
Marvin López Roblero

1. Signo de ANDERSON: estando el paciente en posición genupectoral, presionando el cuello uterino, la pared vaginal y el ano, se pueden distinguir el prolapso simple, la existencia de un enterocele o cistocele y las adherencias permanentes
2. Signo de ANDRE-THOMAS: en las afecciones cerebelosas, rebote del brazo sobre la cabeza cuando estando el primero encima de la segunda, se le dice al enfermo que lo deje caer súbitamente sobre la cabeza
3. Signo de ANGELESCU: imposibilidad de doblar la columna vertebral en decúbito supino en la tuberculosos de las vértebras
4. Signo de ARNOSS: en los enfermos con meningitis leve, el paciente con los brazos cruzados sobre el pecho, no puede incorporarse de la cama
5. Signo de ARNOUX: ritmo peculiar del latido cardíaco fetal durante el embarazo gemelar, semejante al del trote de los caballos
6. Signo de ARROYO: debilidad del reflejo pupilar. Astenocoria
7. Signo de AUENBRUGGER: abultamiento en el epigastrio debido a la extensión de un derrame pericardíaco
8. Signo de AUEFRECHT: sonido respiratorio débil percibido en la fosa yugular, signo de estenosis traqueal
9. Signo de AUSPITZ: hemorragias puntuales después de la eliminación de placas de psoriasis (\*)
10. Signo de AVIRAGNET: cerco blanco alrededor de las manchas eruptivas de la roseóla
11. Signo del abanico: se caracteriza por la dorsiflexión del dedo gordo con abducción o separación extrema de los demás. Se presenta en el síndrome congénito distóxico con lesión del córtex premotor
12. Signo del arco: el examinador, teniendo la mano del paciente en supinación, con los dedos flexionados, percute con su mano derecha, mediante pequeños y repetidos golpes, la base de los dedos del enfermo. En los enfermos del fascículo piramidal, se obtiene un movimiento en arco de los dedos (rápido movimiento

de extensión, seguido de la vuelta inicial de flexión). También se denomina signo de Grigorescu.

13. Signo de AARON: sensación de dolor en el epigastrio o región precordial por

presión en el punto de Mac Burney en el apendicitis

14. Signo de ABADIE: espasmos de músculo elevador del párpado superior con

retracción de la pestaña superior, de tal manera que la esclerótica es visible debajo de la córnea. Suele acompañar el bocio exoftálmico. Se observa en la enfermedad de Basedow

15. Signo de ABADIE: pérdida de la sensación dolorosa normalmente producida al

presionar fuertemente el tendón de Aquiles. Suele darse en la ataxia locomotriz

progresiva o tabes dorsalis

16. Signo de ABRAHAMS: sonido mate obtenido por percusión sobre la apófisis

acromion en los primeros períodos de tuberculosis del vértice del pulmón.

17. Signo de AHLFELD I: un signo presuntivo de embarazo: contracciones irregulares del útero después del tercer mes de embarazo

18. Signo de AHLFELD II: un signo de pérdida de la placenta. Después del parto,

aparece el cordón umbilical en la cavidad vulvar. Cuando más sale de la vulva,

más avanza la placenta hacia abajo

19. Signo de aire creciente: un signo pulmonar presente en la aspergilosis, también

llamado signo de Monod, está caracterizado por radiolucencia en menisco alrededor de una opacidad pulmonar. Está fuertemente asociada a hemorragia pulmonar, con hemoptisis subsecuente

20. Signo de AKERLUND: signo radiológico de úlcera gastrointestinal, consistente

en la posición asimétrica del píloro por retracción bulbar

21. Signo de ALBARRAN: un signo de cáncer en la pelvis del riñón. También hemorragia que sobreviene durante un cateterismo uretral, cuando el líquido inyectado distiende la pelvis renal

22. Signo de ALDAMIZ-ECHEVARRIA: en el neumotórax espontáneo, la percusión de una costilla cerca de la campana del estetoscopio aplicado produce

un sonido parecido que se produce al golpear una vasija metálica

23. Signo de ALLEN: elevación simultánea de la temperatura, pulso y respiración

en la trombosis de las venas de la pierna.

24. Signo de ALLIS: un signo clínico de fractura de cuello de fémur en el cual el

trocánter sube hacia arriba y relaja la fascia lata de tal manera que un dedo penetra profundamente entre el trocánter mayor y la cresta ilíaca

25. Signo de AMOSS: en la flexión dolorosa del raquis el paciente debe sentarse en

la cama estando en posición supina tiene que apoyarse con las manos aplicadas

de plano sobre la misma

27. Signo de AMUSSAT: desgarró de la túnica interna de la carótida primitiva por

debajo de su bifurcación que se observa en la autopsia de algunos ahorcados

28. Signo de ARCE: signo radiológico observado por comparación de las imágenes

radiográficas antes y después de un neumotórax en los tumores de pulmón. Se observa un doble desplazamiento horizontal y vertical hacia el ilio. Si las sombras no se mueven, el tumor es extrapulmonar