



Mi Universidad

SINTOMAS MEDICOS

JOSE FRANCISCO MORENO DOMINGUEZ

SINTOMAS MEIDCOS

Angina de Pecho: insuficiencia coronaria, este síntoma está caracterizado por la aparición de dolor en la región izquierda del pecho, con sensación de angustia.

Mialgia: se refiere al dolor muscular.

Artralgia: se refiere al dolor articular

Hiperalgia: es la percepción exagerada de dolor.

Disestesia: es la percepción táctil anormal y desagradable.

Algesia: sensibilidad al dolor.

Anosmia: es la ausencia de la capacidad olfativa.

Fatiga: es la sensación de cansancio o agotamiento.

Heminegligencia: es una alteración neurológica vinculada a trastornos de la atención.

Náuseas: es la sensación de ganas de vomitar.

Dolor Nociceptivo: es el captado por los nociceptores, que son los encargados de percibir y transmitir el dolor, este tipo de dolor se subclasifica en:

Dolor reflejo: es el dolor en una parte determinada del organismo causado por una lesión, que deriva en un dolor que se produce en otra zona de nuestro cuerpo.

Dolor irradiado: es el producido por una irritación de una raíz nerviosa, el paciente refiere el dolor en el territorio cuya sensibilidad inerva esta raíz, y no en el lugar en el que ésta está siendo comprimida.

Dolor referido: es igualmente un dolor extendido en una distancia lejana de su origen primario, pero se diferencia del anterior en que, en el dolor irradiado las partes lesionadas son las vías nerviosas, en este se produce en las estructuras esqueléticas.

Dolor neuropático: es causado por una alteración nerviosa puede ser punzante, intenso o penetrante; en cualquier caso, es un dolor difícil de describir por el paciente y que también resulta ser muy persistente.

Dolor radicular: suele ser producto de una compresión o inflamación del nervio espinal. este dolor es característico de las patologías por hernias discales.

Dolor facetario: también llamado síndrome facetario es aquel dolor que proviene de una lesión proveniente de cualquiera de las estructuras de tejido articular. Este tipo de dolor se presenta con mayor recurrencia a nivel lumbar.

Dolor discogénico: este tipo de dolor se produce por el proceso degenerativo de uno o más discos intervertebrales, puede exacerbar con las posturas prolongadas o actividades que involucre peso y repetitividad.

Anorexia: Pérdida del apetito

Polidipsia: Sed excesiva

Polifagia: Comida excesiva o una hiperalimentación

Disfagia: Dificultad para tragar

Ascitis: Líquido en la cavidad peritoneal

Adenomegalia: Aumento de volumen de ganglios

Hiperhidrosis, no especificada: Sudoración excesiva y sudores nocturnos

Bibliografía:

Síntomas y signos clínicos. Fisionline. Recuperado de <https://www.fisioterapiaonline.com/glosario/sintomas-y-signos-clinicos>