

UNIVERSIDAD DEL SURESTE
INTERCULTURALIDAD Y SALUD.

MEDICINA HUMANA

UNIDAD 3


SINTOMAS MEDICOS

YERENI MONSERRAT PEREZ NURICUMBO

DR. RICARDO ACUNA DE SAZ

PRIMER SEMESTRE

1°A



Neumotórax

ocurre cuando hay fugas de aire en el espacio entre los pulmones y la pared torácica. (GUZMÁN, 2022)

Dolor torácico

Es una molestia o dolor que se siente en algún punto a lo largo de la parte frontal del cuerpo entre el cuello y el abdomen superior.

Mastalgia

El dolor de mamas

El dolor de mamas cíclico

Claramente relacionado con el ciclo menstrual y los cambios en los niveles hormonales.

Dolor de mamas extramamario

El término extramamario significa fuera de la mama. El dolor en las mamas extramamario se siente como si se originara en el tejido de la mama, pero su procedencia en realidad está en otro lado. El desgarrar de un músculo del tórax, por ejemplo, puede causar dolor en tu pared torácica o en la caja torácica que se expande (irradia) hasta la mama.

Quistes

mamarios son sacos llenos de líquido que se forman dentro de las mamas. Suelen ser no cancerosos (benignos).

Secreción del pezón

Es cualquier líquido que sale de la zona del pezón en la mama.

Poliuria

Emisión de volumen excesivo de orina.

Quiluria

Orina lechosa por presencia de grasa (lipuria)

Polaquiuria

Aumento de la frecuencia urinaria; La polaquiuria es la necesidad de orinar muchas veces durante el día o la noche (nocturia), pero en volúmenes normales o inferiores a lo normal..

Orquialgia

Testículo doloroso

Oligospermia

Escasez de espermios en el semen

Nefroptosis

Riñón caído, ectópico, móvil o flotante

Dolor prostático

Su causa más frecuente es la prostatitis aguda. Irradiado a región perineal y rectal, se acompaña de síntomas de irritación vesical.

Cistitis

es el término médico para la inflamación de la vejiga. La inflamación se produce cuando una parte del cuerpo está hinchada y caliente. También puede ser dolorosa.

La oliguria

La oliguria se define con una emisión de orina < 500 mL en 24 horas en un adulto o < 0,5 mL/kg/h en un adulto o un niño (< 1 mL/kg/h en neonatos).

Hematuria

Sangre en la orina

Disuria

se refiere a cualquier dolor o incomodidad asociada con la micción (orinar). No se refiere a la frecuencia al orinar, aunque las enfermedades relacionadas con la frecuencia a menudo tienen como síntoma la disuria. (cleveland clinic, s.f.)

Nicturia

Despertar una o más veces durante la noche debido a la necesidad de orinar.

Oliguria y Anuria: En la oliguria la diuresis es menor de 500 ml diarios, mientras que la anuria es la ausencia de diuresis. Puede ser por una disminución del filtrado glomerular o por un aumento de la absorción del agua a nivel tubular.

Estranguria

Orinar lentamente (stranx)

Incontinencia

El término incontinencia hace referencia a las pérdidas involuntarias de orina

Micción

El acto de orinar (miccionar).

Vejiga débil

La vejiga débil es un término casi sinónimo de incontinencia, y se refiere a la pérdida involuntaria de orina.

Angina de Pecho

Tipo de dolor de pecho ocasionado por una disminución de la irrigación

Neumotorax:

ocurre cuando hay fugas de aire en el espacio entre los pulmones y la pared

Referencias

biblat. (201). Obtenido de <https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-de-nefrologia-dialisis-y-transplante/articulo/la-oliguria-y-su-contexto>

cleveland clinic. (s.f.). Obtenido de <http://www.clevelandclinic.org/health/shic/html/s15176.asp>

GUZMÁN, D. M. (2022). Obtenido de <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/neumotorax>