



Universidad del sureste

Medicina humana

Nombre del alumno: Joseph Eduardo Córdova Ramírez

Nombre del docente: Samuel Esau Fonseca Fierro

Nombre de la materia: Sexualidad humana

Actividad: Cuadro comparativo sobre las Enfermedades vaginales

Enfermedades	Características	Diferencias	Diagnostico	Tratamiento
Vaginitis	En esta enfermedad incluyen secreciones vaginales anormales, picazón o irritación, micción dolorosa y dolor durante las relaciones sexuales.	La vaginitis es generalmente ocasionada por un cambio en el equilibrio normal de las bacterias vaginales, una infección o una reducción en los niveles de estrógeno después de la menopausia	Revisar antecedentes médicos. Examen pélvico. Muestra de análisis para prueba en el laboratorio.	Suministrar antifungico, antibiotico y hormona
Candidiasis vaginal	Esta afección puede causar inflamación, comezón intensa y una secreción espesa y blanca de la vagina	Este tipo de infección fúngica es causada por un hongo denominado cándida. Esta afección puede causar inflamación, comezón intensa y una secreción espesa y blanca de la vagina.	Es fundamentalmente clínico, aunque en ocasiones es necesario apoyarse en un examen directo de las escamas o en un cultivo micológico.	Generalmente se tratan con una crema o supositorio antimicótico de venta libre, como miconazol (Monistat 1), clotrimazol (Lotrimin AF, Mycelex, Trivagizole 3), butoconazol (Gynazole-1) o tioconazol (Vagistat-1).
Tricomoniasis	La tricomoniasis causa secreciones vaginales fétidas, picazón en los genitales y micción dolorosa en las mujeres. Por lo general, los hombres no presentan síntomas	La tricomoniasis es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes. Los factores de riesgo son tener varias parejas sexuales y no usar preservativo durante el acto sexual.	Es imposible diagnosticar la tricomoniasis basándose únicamente en los síntomas. Tanto a los hombres como a las mujeres	El proveedor de atención médica puede prescribirte tabletas de metronidazol (Flagyl) o tinidazol (Tindamax).