



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA



MATERIA:

FARMACOLOGIA

TEMA:

"realizar un Mapa conceptual preciso sobre la fisiopatología del dolor"

DR. DE LA MATERIA:

ALFREDO LOPEZ

LOPEZ

DR. ALUMNADO:

BRYAN REYES GONZÁLEZ

FECHA:

DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2022

CICLO:

3ER

SEMESTRE



# DOLOR

## CONSIDERACIONES ESPECIALES

PRESTAR ATENCIÓN AL LENGUAJE NO VERBAL EN LOS NIÑOS. EN ADULTOS MAYORES EL DOLOR ABDOMINAL DISMINUYE SUS MANIFESTACIONES.

## INTERROGATORIO

INTERROGAR:  
LOCALIZACIÓN, TIPO DE DOLOR, AGRAVANTES, ALTERNANTES, RADIACIÓN Y CROMOLOGIA.

## CLASIFICACIÓN

## FISIOPATOLOGIA

EL ESTIMULO DOLOROSO VIENE DEFINIDO POR LA SENSACIÓN QUE PRODUCE, NO EXISTIENDO EN ALGUNAS OCASIONES UNA RELACIÓN ESTRECHA ENTRE EL ESTIMULO CAUSAL Y LA REACCION QUE OCACIONA.

## DEFINICIÓN

ASP: "UNA EXPERIENCIA SENSORIAL Y EMOCIONAL DESAGRADABLE ASOCIADA CON UNA LESION TISULAR, RENAL O POTENCIAL, O QUE SE DESCRIBE COMO LA OCACIONADA POR DICHA LESION O CUYA PRESENCIA ES REVELADA POR MANIFESTACIONES VISIBLES Y/O AUDIBLES DE LA CONDUCTA.

### CURSO

CONTINUO. IRRUPTIVA.

### INTENSIDAD

SE UTILIZAN ESCALAS COMO:  
EVA  
OMS.

### CALIDAD O CARÁCTER.

- COLICO
- URENTE
- SONIDO
- PULSÁTIL
- PUNGITIVO
- TEREBRANTE
- CALAMBRE
- TENSIVO

### LOCALIZACIÓN.

En función del sistema que se vea afectado podemos encontrar diversos tipos de **dolor**: el que afecta al sistema nervioso, al sistema respiratorio y cardiovascular, al sistema musculoesquelético, al sistema cutáneo y subcutáneo, al sistema gastrointestinal y al sistema genitourinario.

### PATOGENIA.

**LOCALIZACIÓN.**  
El dolor resulta de la activación de los **nociceptores periféricos por la liberación de neurotransmisores, y por la disminución del umbral de respuesta de las fibras nociceptivas.** Cuando existe una injuria tisular los nociceptores "silentes" son reclutados, respondiendo posteriormente a una serie de estímulos

### SEGÚN SU DURACIÓN.

Es un dolor tipo cólico y aumenta con la palpación. Por otro lado, el dolor se puede clasificar en agudo o crónico, según su duración: El dolor agudo se considera cuando dura menos de 1 mes. El dolor crónico es aquel que dura más de 3 meses.