

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

UDS



SEMESTRE:

3er SEMESTRE

NOMBRE:

Yajaira gpe. Méndez Guzmán

DOCENTE:

DR . Samuel Esau Fonseca

FECHA:

11/10/2022



sarampión

Infección infantil causada por un virus. El sarampión, o rubéola, se transmite con facilidad y puede ser grave e incluso mortal para los niños pequeños. Se puede prevenir gracias a una vacuna



Síntomas

Fiebre, tos seca, goteo de la nariz, dolor de garganta, conjuntivitis, manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca, en la cara interna de la mejilla, también denominados manchas de Koplik, sarpullido constituido por manchas grandes

Causas


El sarampión es una enfermedad causada por un virus que se encuentra en la nariz y en la garganta de un niño o adulto infectado.

Factores de riesgo.

El texto de No estar vacunado, viajar a otros países, tener insuficiencia de vitamina A.
párrafo

TRATAMIENTO

No existe ningún medicamento para tratar el sarampión y, por lo general, la infección disminuye en dos o tres semanas.



TETANOS

Enfermedad aguda por la neurotoxina de Clostridium tetani

Se caracteriza por espasmo del músculo estriado y disfunción del sistema nervioso autónomo



PATOGENIA

Contaminación de heridas por esporas de Clostridium tetani. La toxina penetra en el SNC a través de las terminales presinápticas de las sinapsis neuromusculares.

CUADRO CLINICO

- Aumenta el tono muscular
- espasmos generalizados
- risa sardónica
- Opistótonos

AFECTACION

- local: nervios que integran la zona de la herida
- generalizada: vasos sanguíneos, linfáticos, y es transportada a distancia hacia las terminales nerviosas.

TRATAMIENTO

No hay una cura para el tétanos. Una infección por tétanos requiere cuidados de emergencia y de apoyo a largo plazo mientras la enfermedad sigue su curso.



EPIDEMIOLOGIA TRACOMA

Es una queratocconjuntivitis, generada por chlamydia *Trachomatis*. Es la primer causa principal infecciosa de ceguera en el mundo, Es la octava causa de ceguera en el mundo, Problema de salud pública, causa de ceguera prevenible

En Mexico es endemico, énfasis en Chiapas se restringe a los municipios de las altos

Información persistente y recurrente que puede progresar a cicatrización de la conjuntiva esa cicatrización lleva a una triquiasis **pestañas invertidas al ojo**, afecta la conjuntiva palpebral

Promoción a la Salud

Jóvenes y niñas con acceso insuficiente al agua, fácil transmisión de secreciones oculares, pobre limpieza facial, vivir en zona endémica, mascar sarbans, Nivel socioeconómico bajo.

Diagnóstico

Primer nivel de atención: ojo rojo, episodios recurrentes, Descarga purulenta, dolor ocular, Fotofobia, irritación aguda de visual baja

Exploración física: Cicatrización de conjuntiva, oscurecimiento de la vasculatura, opacidad corneal.

Prueba diagnóstica estándar de oro: Prueba reacción en cadena de la polimerasa para detectar chlamydia

Tratamiento: **Farmacológico:** estrategia SAFE: cirugía triquiasis, tratamiento antibiótico, educación limpieza facial, mejorar el saneamiento del ambiente

Esquema antibiótico según OMS: Azitromicina 20 mg/kg dosis única máxima 1g en niños
Adultos 1g Alternativa a macrólidos dar tetraciclina ungüento oftálmico