



MAPA CONCEPTUAL

POLIMIOSITIS


La polimiositis afecta los músculos esqueléticos. También es conocida como miopatía inflamatoria idiopática. La causa exacta se desconoce, pero podría estar relacionada con una reacción autoinmunitaria o con una infección.

DIAGNOSTICO

Un análisis de sangre le permitirá al médico saber si tienes niveles elevados de enzimas musculares, lo que puede indicar un daño muscular.

TRATAMIENTO

Los dos medicamentos más frecuentemente usados para tratar la polimiositis son la azatioprina (Azasan, Imuran) y el metotrexato (Trexall). Otros medicamentos que se recetan para la polimiositis son el micofenolato mofetilo (CellCept), la ciclosporina y el tacrólimus.



POLIMIOSITIS VS DERMATOMIOSITIS

DERMATOMIOSITIS

Se desconoce la causa de la dermatomiositis, pero la enfermedad tiene mucho en común con los trastornos autoinmunitarios, aquellos en los que el sistema inmunitario ataca por error a los tejidos del cuerpo.

DIAGNOSTICO

Una biopsia del músculo podría revelar la inflamación del tejido muscular u otros problemas, como daño o infección.

TRATAMIENTO

Los dos medicamentos más comunes para la dermatomiositis son la azatioprina (Azasan, Imuran) y el metotrexato (Trexall). El micofenolato de mofetilo (CellCept) es otro medicamento que se usa para tratar la dermatomiositis, especialmente si los pulmones están afectados.. Medicamentos antipalúdicos y Protectores solares. Es importante proteger la piel de la exposición al sol mediante la aplicación de protector solar

