



DERECK HARPER NARCIA

“CUADRO SINOPTICO”

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

MATERIA: REHABILITACIÓN  
FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
DR: MONICA GORDILLO  
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

# Cuadro clínico

## Duchenne

### Cuadro clínico

- La debilidad afecta los músculos proximales, en general de los miembros inferiores en las etapas iniciales. Los niños suelen caminar en puntas de pie, y tienen marcha de pato y lordosis. Tienen dificultad para correr, saltar, subir escaleras y levantarse del suelo.

## Becker

### Cuadro clínico

- por lo general se vuelve sintomática mucho más tarde y es más leve. La deambulación suele estar preservada hasta por lo menos los 15 años de edad, y muchos niños siguen caminando hasta la adultez. La mayoría de los niños afectados sobreviven hasta la cuarta o la quinta década de la vida.

## De cinturas

### Cuadro clínico

- Marcha anormal y algunas veces similar a la del pato
- Articulaciones que están fijas en una posición de contractura (al final de la enfermedad)
- Pantorrillas grandes y de apariencia muscular (seudohipertrofia), que realmente no son fuertes
- Pérdida de masa muscular y adelgazamiento de ciertas áreas del cuerpo
- Lumbago
- Papilaciones o episodios de pérdida del conocimiento
- Debilidad en los hombros
- Debilidad de los músculos faciales (al final de la enfermedad)
- Debilidad en los músculos de la parte inferior de las piernas, en los pies, en la parte inferior del brazo y en las manos

## Facio escapulo humeral

### Cuadro clínico

- Párpado caído
- Incapacidad para silbar, debido a la debilidad en los músculos de las mejillas
- Disminución de la expresión facial
- Expresión facial deprimida o furiosa
- Dificultad para pronunciar palabras
- Dificultad para alcanzar objetos sobre el nivel del hombro

