



Universidad del sureste

Medicina Física y Rehabilitación

Asesora: Mónica Gordillo Rendón

**“Diagrama de flujo prevención y diagnóstico
prenatal”**

Alumno: Noé Agustín Nájera Zambrano

Medicina humana

Prevención

Mujer en edad reproductiva, con deseo de embarazo



Asegurar ingesta de Acido fólico 0.4 mg (400 mcg/día), tres meses previos a embarazarse y hasta las 12 semanas de gestación Mujeres que por antecedentes , condición social o geográfica, presenten alto riesgo para presentar defectos del tubo neural, deben ingerir 4 mg. de ácido fólico durante la etapa periconcepcional Recomendar la ingesta de alimentos ricos en ácido fólico

Diagnóstico Prenatal

Mujer embarazada con factores de riesgo para defectos del tubo neural

Realizar Ultrasonido al inicio del segundo trimestre del embarazo:

- Realizado por personal experto
- Con ultrasonografo de alta resolución [Capte la atención de los lectores]

¿Sospecha de espina bífida?

NO

SI

- Solicitar alfafetoproteína
- Realizar nuevo Ultrasonido entre la semana 18 y 20 de gestación

Continuar programa de control prenatal normal
Continuar programa de control prenatal normal

¿confirmación de espina bífida?

NO

SI

- Consejo genético
- Realizar nuevo Ultrasonido entre la semana 18 y 20 de gestación

- Continúa vigilancia del embarazo
- Valorar vía de nacimiento de acuerdo a las condiciones técnico-médicas del binomio
- Solicitar valoración por neurocirugía, para orientación a los padres