

PREVENCIÓN

MUJER EN EDAD REPRODUCTIVA CON DESEO DE EMBARAZO

ASEGURAR INGESTA DE ÁCIDO FÓLICO 0.4 MG (400 MCG/DÍA), TRES MESES PREVIOS A EMBARAZARSE Y HASTA LAS 12 SEMANAS DE GESTACIÓN

MUJERES QUE POR ANTECEDENTES, CONDICIÓN SOCIAL O GEOGRÁFICA, PRESENTEN ALTO RIESGO PARA PRESENTAR DEFECTOS DEL TUBO NEURAL, DEBEN INGERIR 4 MG. DE ÁCIDO FÓLICO DURANTE LA ETAPA PERICONCEPCIONAL

RECOMENDAR LA INGESTA DE ALIMENTOS RICOS EN ÁCIDO FÓLICO

DIAGNÓSTICO PRENATAL

MUJER EMBARAZADA CON FACTORES DE RIESGO PARA DEFECTOS DEL TUBO NEURAL

REALIZAR ULTRASONIDO AL INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EMBARAZO:

- REALIZADO POR PERSONAL EXPERTO
- CON ULTRASONOGRAFO DE ALTA RESOLUCIÓN

CONTINUAR PROGRAMA DE CONTROL PRENATAL NORMAL

SI

SOSPECHA DE ESPINA BIFIDA

NO

–SOLICITAR ALFAFETOPROTEINA
–REALIZAR NUEVO ULTRASONIDO ENTRE LA SEMANA 18 Y 20 DE GESTACIÓN

CONFIRMACIÓN DE ESPINA BIFIDA

–CONSEJO GENÉTICO
–REALIZAR NUEVO ULTRASONIDO ENTRE LA SEMANA 18 Y 20 DE GESTACIÓN

- CONTINUA VIGILANCIA DEL EMBARAZO
- VALORAR VÍA DE NACIMIENTO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES TÉCNICO-MÉDICAS DEL BINOMIO
- SOLICITAR VALORACIÓN POR NEUROCIRUGÍA, PARA ORIENTACIÓN A LOS PADRES

BIBLIOGRAFÍA

<http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/269GRR.pdf>