



# GLAUCOMA DE ÁNGULO CERRADO VS ABIERTO

EL GLAUCOMA ES UN PADECIMIENTO QUE AFECTA AL NERVIÓ ÓPTICO, POR LO QUE PUEDE CAUSAR LA PÉRDIDA DE LA VISIÓN.



## Glaucoma de Ángulo Abierto

Suele ser una enfermedad **asintomática**, que genera pérdida visual **irreversible**. Hay factores de riesgo que influyen en su desarrollo. Entre ellos se encuentran:

- La edad. Mayores de 60 años
- Ubicación geográfica. Afroamericanos y Latinos
- Antecedente familiar en primer grado
- Consumo de Corticoides, tales como Dexametasona, Prednisolona e Hidrocortisona, entre otros, en forma de gotas, cremas, inhaladores o por vía oral
- Enfermedades como Hipertensión Arterial y Diabetes

Entre más factores de riesgo tenga el paciente, más aumentará la probabilidad de desarrollar Glaucoma.

## Glaucoma de Ángulo Cerrado

Es una patología que tiene una alta probabilidad de producir Pérdida Visual irreversible si no es detectada a tiempo. Existe mayor riesgo de sufrirlo si se padece de Hipermetropía o se tiene un familiar en primer grado con esta enfermedad.

El ángulo estrecho se puede detectar mediante una consulta oftalmológica, con la realización de una Gonioscopía.

Para su tratamiento se puede realizar un procedimiento con láser (Iridotomía), para abrir el ángulo y disminuir este riesgo.

Es importante mencionar que si se detecta a tiempo se puede llegar a evitar el desarrollo del Glaucoma, por lo que es importante acudir a consulta oportunamente.