



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

PRESENTA

Lucía Guadalupe Zepeda Montúfar

**SEPTIMO SEMESTRE EN LA LICENCIATURA DE MEDICINA
HUMANA**

TEMA: Cirugías urológicas

ACTIVIDAD: Ensayo

ASIGNATURA: Clínica quirúrgica complementaria

UNIDAD IV


CATEDRÁTICO: Dr. Alfredo López López

TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS A 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

RESECCIÓN TRASURETRAL DE LA PROSTATA

Definición: Es una cirugía que se utiliza para tratar problemas urinarios cuya causa es el agrandamiento de la próstata.

Procedimiento



Se inserta un instrumento llamado resectoscopio a través de la punta del pene y dentro de la uretra. El resectoscopio es de ayuda para ver y recortar el exceso de tejido prostático que bloquea el flujo de orina. La resección transuretral de próstata se considera generalmente una opción para los hombres que tienen problemas urinarios moderados a graves que no respondieron a los medicamentos. A pesar de que se consideró la resección transuretral de próstata como el tratamiento más eficaz para el agrandamiento de la próstata, otros procedimientos mínimamente invasivos se están volviendo más eficaces. Estos procedimientos generalmente causan menos complicaciones y tienen un período de recuperación más corto que la resección transuretral de próstata.

Motivos del procedimiento quirúrgico

Ayuda a reducir los síntomas urinarios que causa la hiperplasia prostática benigna, como los siguientes:

- Necesidad frecuente y urgente de miccionar
- Dificultad para comenzar la micción
- Micción lenta (prolongada)
- Micción más frecuente durante la noche
- Detenerse y comenzar a miccionar nuevamente
- Tenesmo vesical
- ITU

Patologías que previene dicho procedimiento:

- Infección recurrente de las vías urinarias
- Lesión en los riñones o en la vejiga
- Incapacidad para controlar la micción o incapacidad total para miccionar
- Cálculos en la vejiga
- Sangre en la orina

Efectos adversos de la cirugía

- Infección urinaria
- Disfunción eréctil
- Sangrado intenso
- Dificultad para contener la orina
- Necesidad de volver a realizar el tratamiento

Pronóstico: Por lo general, la resección transuretral de la próstata alivia los síntomas rápidamente. La mayoría de los hombres comienzan a notar un flujo de orina mucho más fuerte en pocos días.

PROTASTECTOMÍA RADICAL ABIERTA

Definición: Es la extirpación quirúrgica de la próstata.

Procedimiento: Se hace con anestesia general o raquídea; Por lo general, se hace una incisión en la parte baja del abdomen, aunque a veces la incisión se hace entre el recto y la base del pene. Puede colocarse una sonda en la vejiga a través de la piel en la parte inferior del abdomen para ayudar a irrigar la vejiga (lavado vesical postoperatorio) y otra sonda sale del pene para drenar la orina. Este procedimiento requiere una estancia hospitalaria y un período de recuperación ligeramente más largos que la resección transuretral de la próstata.

Motivos de procedimiento

- Próstata muy grande.
- Tiene divertículos vesicales o cálculos vesicales.

Riesgos de la prostatectomía abierta

- La posible necesidad de una transfusión sanguínea.

- Incapacidad para tener relaciones sexuales debido a problemas de erección.
- Vejiga hiperactiva
- Incontinencia imperiosa
- Incontinencia
- Eyaculación retrógrada

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

- Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd edition, 2017).
- E. Gregory Thompson MD - Medicina interna & Adam Husney MD - Medicina familiar & J. Curtis Nickel MD, FRCSC – Urología.