

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICINA HUMANA

SEPTIMO SEMESTRE

CRECIMIENTO Y DESARROLLO BIOLÓGICO

CONDILOMAS ACUMINADOS

DR JOSE MANUEL CULEBRO RICALDI

MARIA MERCEDES MARROQUIN HERNANDEZ

13-11-2022

CONDILOMAS ACUMINADOS

Los condilomas anogenitales son altamente infecciosos, con una tasa de transmisión cercana al 65% desde una persona infectada a una pareja sexual susceptible

persisten durante períodos prolongados y raramente pueden malignizarse



Los pacientes infectados por VIH presentan una prevalencia de condilomas anogenitales de 5,3%. En este grupo de pacientes, en el que se asocia inmunosupresión y elevada prevalencia de infección VPH, los condilomas anogenitales constituyen un problema importante de salud.

MANIFESTACIONES CLINICAS

Lesiones asintomáticas

los condilomas anogenitales pueden producir síntomas como prurito, sangrado, fisuras o dispareunia.

Los condilomas anogenitales son proliferaciones, verrugas, de pocos milímetros de diámetro de coloración variable desde blanco grisácea y rosada en áreas mucosas a amarroada en áreas cutáneas.



DIAGNOSTICO

Es fundamentalmente clínico y basta con examinar la lesión a simple vista con una buena fuente de luz

El colposcopio puede ser útil para la exploración de pequeñas lesiones.

En la mujer, se debe explorar siempre el área perianal y colocar un espéculo para explorar la vagina y cérvix.



TRATAMIENTO

MEDICAMENTO

- Imiquimod
- Podofilina y podofilox
- Ácido tricloroacético
- Sinecatequines

CIRUGIA

- Congelación con nitrógeno líquido
- Electrocauterización
- Escisión quirúrgica

