



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MEDICINA HUMANA

MÉDICO: Miguel Ricaldi

ACTIVIDAD mapa conceptual

ESTUDIANTE: CARLOS MANUELLAZARO VICENTE

7MO SEMESTRE

NUMERO DE LISTA:4

A:12 DE OCTUBRE DEL 2022

PROSTATITIS

La prostatitis es un trastorno de la glándula prostática que por lo general se asocia con inflamación. La prostatitis con frecuencia provoca dolor o dificultad al orinar, además de dolor en la ingle, la zona pélvica o los genitales

QUIEN PUEDE PADECERLO

Los hombres de 50 años o más que tienen agrandamiento de la próstata (hiperplasia benigna de próstata) presentan un mayor riesgo de sufrir prostatitis.

Clínicamente se distinguen varios síndromes prostáticos que han sido agrupados en.

Síntomas más habituales: Disuria.

Frecuencia y urgencia o imperiosidad miccional. Micción dolorosa. Retención aguda de orina.

Prostatitis bacteriana aguda: Infección aguda de la glándula prostática.

Prostatitis bacteriana crónica: Infección urinaria recurrente. Infección crónica prostática.

Síndrome de dolor pelviano crónico inflamatorio (leucocitos en semen, secreción prostática post-masaje o micción post-masaje).

Síndrome de dolor pelviano crónico no-inflamatorio (sin leucocitos en semen)

El diagnóstico de la prostatitis se hará en base a la historia clínica, exploración, cultivo fraccionado de orina, cultivo de semen, ecografía, estudio analítico en sangre (PSA elevado en la prostatitis aguda) y biopsia prostática en algunos casos de prostatitis

EL TRATAMIENTO

De la prostatitis aguda bacteriana no complicada se realiza con ciprofloxacina 500 mg cada 12 horas o levofloxacina 500 mg cada 24 horas por vía oral. Las quinolonas alcanzan concentraciones dentro de la próstata tres o cuatro veces superior que las alcanzadas con los antibióticos beta lactámicos

Medicamentos anti-inflamatorios, junto con un baño de asiento templado (sentarse en 2-3 pulgadas de agua templada). Este es el tratamiento más conservador para la prostatitis crónica.

Evitar alimentos que desencadenan los síntomas, como la cafeína, los alimentos picantes, y el alcohol.

Usar un cojín si te vas a sentar durante largos periodos de tiempo.

Medicamentos antibióticos para la prostatitis infecciosa. Para la prostatitis

BILIOGRAFIA

<https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/prostatitis/symptoms-causes/syc-20355766>

<https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/prostatitis>