

Paciente femenino de 25 años de edad, casada, la cual acude al servicio de Urgencias por presentar desde hace 5 días sangrado transvaginal color rojo oscuro.

Refiere además que hace 3 días inició con dolor tipo cólico intermitente en fosa iliaca derecha.

Acompañada de nauseas, vómito

Menarca 14 años, IVSA 20 años, Utiliza Preservativo en ocasiones, tuvo un

Aborto espontáneo hace 9 meses por infección vaginal . FUM incierta.

Pruebas iniciales

Subunidad beta de hCG positiva de 1600mU/ml

US transvaginal:

No detecta embarazo intrauterino ni líquido libre en cavidad,

Signos vitales:

TA: 100/50 mmHg

FR: 24 rpm

FC 80 lpm

T36.79C

Talla 1.60m

IMC: 17 kg/m².

Peso 44 kg

Bh

ERITROCITOS. 3.5

HEMOGLOBINA. 10.1

HEMATOCRITO.

40.3

VOLUMEN GLOBULAR MEDIO.. 88.6

Hgb. CORPUSCULAR MEDIO. 28.4

CONT.MED.Hbg.CORPUSCULAR. 33.1

Plaquetas 228.3

A la EF:

Consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, adecuada coloración e hidratación de piel y mucosas, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen plano, blando, doloroso a la palpación profunda en ambas fosas iliacas, peristalsis presente.

Al tacto vaginal:

Cavidad eutermica, cérvix posterior cerrado, sin cambios cervicales, con presencia de huellas de sangrado, extremidad sin alteraciones

Diagnóstico

Embarazo ectópico