

Se trata de paciente femenina de 35 años de edad, casada de ocupación comerciante, escolaridad licenciatura.

Motivo de la consulta: fatiga, sed excesiva y hambre excesiva

- APNP: De religión católica negando toxicomanías y ejercicio.
- APP: refiere aver padecido fiebre reumática a los 10 años de edad, niega alergias, hospitalizaciones trasfusiones y refiere aver obtenido la vacuna toxoide tetánico. Grupo sanguíneo RH A+.
- En su segundo embarazo se le manda hacer estudios de lab los cuales reportaron:
 - HB:9.9, HTO:31, PLAQUETAS : 229 millones, glucosa: 127 en ayunas y un EGO con glucosa en orina por lo cual se le practica curva de tolerancia oral ala glucosa con resultados de 2 y encima de 240mg, se manejo con dabex 500mg 1c/8hrs y por endocrinología con insulina en la semana 36-37 el EGO reporta cuerpos cetonicos glucosa de 66 y el resto normal. El embarazo es interrumpido en la sem 38 obteniendo un producto de 3600kg.
 - AHF: refiere madre asmática padre diabético, abuelos maternos asmáticos.
 - Antecedentes ginecoobtettricos:
 - Menarca a los 11 años de edad con ciclos regulares ,IVSA a los 28 años G3,P0,A1,C1.refiere no usar método de planificación familiar.Padecimiento actual: después de un año de vaer concluido su segundo embarazo se encuentra curzando su tercer embarazo en la sem 30 con un peso de 92.5 kilos.

Su control avia sido normal asta la sem 10 en la cual presento una glucosa de 88.

En la sem 15 la BH glucosilada de 5.8 en la semana 20 una glucosa posprandial de 139 y en ayunas 112, en la semana 20 se realiza una curva de glucosa posprandias la cual nos da resultados de 60:198, 120:184 y 180:180