

A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow-shaped graphic points to the right from the bar, containing the date.

14-10-2022

Infecciones vaginales

Ginecología y obstetricia

A series of thin, curved lines in shades of blue and grey that originate from the bottom left and curve upwards and to the right.

Maria mercedes marroquin hernandez
UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Patología	Etiología	Factores de riesgo	Transmisión sexual	Cuadro clínico	Característica de flujo	Diagnostico	Tratamiento
Vaginitis bacteriana	Gardnerella vaginalis	Tener múltiples parejas sexuales o una nueva pareja sexual. ... Duchas vaginales. ... Ausencia natural de lactobacilos.	Si	Olor a aminas (pescado) de la secreción vaginal después de la adición de hidróxido de potasio 10 %, presencia de células guías (criterios de Amsel)	Flujo fétido blancogrisáceo	Frotis con tinción gram	Metronidazol en dosis de 500 mg cada 12 horas por vía oral, durante 7 días. Existen tratamientos alternativos por vía vaginal como clindamicina al 2% en crema vaginal o metronidazol al 0,75% en gel, ambos se administran con un aplicador, durante 7 días.
Tricomoniasis vaginal	Trichomonas	Múltiples parejas sexuales. Antecedentes de infecciones de transmisión sexual. Haber tenido tricomoniasis anteriormente. Relaciones sexuales sin preservativo	si	Las mujeres con tricomoniasis pueden notar picazón, ardor, enrojecimiento o dolor en los genitales, molestia al orinar, o una secreción clara con un olor inusual que puede ser transparente, blanca, amarillenta o verdosa.	Flujo amarillo profuso	Microscopio en fresco	Metronidazol 500 mg, oral, 2 veces al día 7 días. Metronidazol 2 g dosis única oral Tinidazol 2 g dosis única oral
Candidiasis	Candida Albicans	Uso de antibióticos. La candidiasis es	No	Prurito vulvar y/o irritación, eritema	Flujo blanquecino escaso	examen directo de las escamas	Clotrimazol 100 mg tab vaginal 7 días

		frecuente en las mujeres que toman antibióticos. ... Aumento de los niveles de estrógeno. ... Diabetes no controlada. ... Sistema inmunitario deteriorado.				o en un cultivo micológico.	o 100 mg 2 veces al día 3 días Nistatina 1 tab vaginal 100 000 UI 14 días 1 aplicación vag (crema)/día 14 días Fluconazol 150 mg oral dosis única
Gonorrea	Neisseria gonorrhoeae	Múltiples parejas sexuales	si	dolor y dificultad al orinar, fiebre escasa y faringitis	Flujo purulento	se puede utilizar una muestra de orina para detectar la gonorrea. Sin embargo, si usted ha tenido relaciones sexuales orales o anales, se puede usar un hisopo para obtener muestras de la garganta o del recto.	Ceftriaxona 125 mg IM dosis única ó Ciprofloxacina 500 mg oral dosis única u Ofloxacina 400 mg oral dosis única ó Norfloxacina 800 mg oral en dosis única. Otro esquema sugerido es adicionar a los esquemas anteriores (para cubrir la posibilidad de infección por chlamydia): Doxiciclina 100 mg 2 veces / día oral x 10 días ó Azitromicina 1 g oral dosis única.

<https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-tratamiento-infecciones-ginecologicas-revision-13132076>