



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
CAMPUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS
MEDICINA HUMANA 7MO SEMESTRE**

**UNIDAD II
CLINICA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA**

INFECCIONES VAGINALES

DR. LUIS IGNACIO GAYOSSO

DEBORA NIETO SANCHEZ

VAGINITIS INFECCIOSA							
	Transmisión sexual	Factores predisponentes	Síntomas	Signos	Ph vaginal	Frotis fresco	Tratamiento
VAGINOSIS BACTERIANA	No	<ul style="list-style-type: none"> Frecuentemente ausentes Más común si hay actividad sexual Nueva pareja sexual <ul style="list-style-type: none"> Uso de DIU 	Presencia de flujo Olor a pescado 50% asintomático	Flujo blanco o gris, filante, abundante	>4.5	Polimorfo nucleares Células clave	1) Metronidazol 500 mg, vía oral dos veces al día por 7 días; 2) Metronidazol 2g vía oral en un sola dosis * Debe evitarse la ingesta de bebidas alcohólicas (efecto antabuse)
CANDIDIASIS	No	<ul style="list-style-type: none"> Frecuentemente ausentes Más común si hay actividad sexual Uso reciente de antibióticos o corticoides <ul style="list-style-type: none"> Embarazo Diabetes mal controlada Huésped con inmunocompromiso 	<ul style="list-style-type: none"> Presencia de flujo <ul style="list-style-type: none"> Prurito Disuria externa Dispareunia superficial <ul style="list-style-type: none"> >20% asintomática 	Flujo blanco, grumoso Eritema y edema de vulva y vagina	<4.5	Levaduras Pseudo hifas	1) Miconazol crema 2%, una aplicación (5 gramos) en vulva y vagina al día, durante 7 días 2) Nistatina óvulos o tabletas vaginales de 100 000 U, una aplicación vaginal al día, durante 14 días
TRICOMONIASIS	Si	<ul style="list-style-type: none"> Múltiples parejas sexuales 	<ul style="list-style-type: none"> Presencia de flujo <ul style="list-style-type: none"> Prurito Disuria 10-50% asintomática 	Flujo blanco o amarillo, espumoso Eritema de vulva y cervix - aspecto de fresa	>4.5	Protozooario flagelado móvil (sensibilidad de 38 a 82 %)	El tratamiento de elección de las VT es: 1) Metronidazol oral 500 mg, dos veces al día por 7 días 2) Metronidazol oral 2 gr, en dosis única El tratamiento alternativo de las VT es: Tinidazole 2 gr en una dosis única