

## CASO NUMERO 2

Paciente femenino de 25 años de edad, casada, la cual acude al servicio de Urgencias por presentar desde hace 5 días sangrado transvaginal color rojo oscuro. Refiere además que hace 3 días inició con dolor tipo cólico intermitente en fosa iliaca derecha. Acompañada de nauseas, vómito Menarca 14 años, IVSA 20 años, Utiliza Preservativo en ocasiones, tuvo un Aborto espontáneo hace 9 meses por infección vaginal . FUM incierta. Pruebas iniciales Subunidad beta de hCG positiva de 1600mU/ml US transvaginal: No detecta embarazo intrauterino ni líquido libre en cavidad, Signos vitales: TA: 100/50 mmHg FR: 24 rpm FC 80 lpm T36.79C Talla 1.60m IMC: 17 kg/m2. Peso 44 kg Bh ERITROCITOS. 3.5 HEMOGLOBINA. 10.1 HEMATOCRITO. 40.3 VOLUMEN GLOBULAR MEDIO.. 88.6 Hgb. CORPUSCULAR MEDIO. 28.4 CONT.MED.Hbg.CORPUSCULAR. 33.1 Plaquetas 228.3 A la EF: Consciente, alerta, orientada en las 3 esferas, adecuada coloración e hidratación de piel y mucosas, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen plano, blando, doloroso a la palpación profunda en ambas fosas iliacas, peristalsis presente. Al tacto vaginal: Cavidad eutermica, cérvix posterior cerrado, sin cambios cervicales, con presencia de huellas de sangrado, extremidad sin alteraciones Diagnóstico Embarazo ectópico.

LUIS FRANCISCO CHIVARDI HERNANDEZ